19255/B

N 34

42900.

SYNOPSIS NOSOLOGIÆ METHODICÆ,

EXHIBENS

CLARISS. VIRORUM

SAUVAGESII, LINNÆI, VOGELII, SAGARI, ET MACBRIDII

SYSTEMATA NOSOLOGICA:

EDIDIT

SUUMQUE PROPRIUM SYSTEMA NOSOLOGICUM

ADJECIT

GULIELMUS CULLEN,

Med. D. & in Acad. Edinburgenſi Med. Pract. Prof. Medic. Reg. apud Scotos Primarius, & Coll. Reg. Med. Edinb. Socius;

NEC NON

Societatum Reg. Londin. Reg. Edinb. Philoſoph. Philadelph. Med. Reg. Pariſ. Med. Hannienſ. & Reg. Med. Edinb. Sodalis.

EDITIO SECUNDA VENETA

JUXTA QUARTAM EMENDATAM

ET PLURIMUM AUCTAM EDINBURGI 1785.

TOMUS PRIMUS.

VENETIIS,

MDCCXCV.

Sumptibus JOANNIS ANTONII PEZZANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

Col. 2. F. 6.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

PARS PRIMA.

GENERA MORBORUM DEFINITA

AB ERUDITISSIMO

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex Nosologia Methodica,
2. tom. 4.to

Amſtel. 1768.

LECTORI

S.

PRODIT jam quarta vice multum, ni nos fallunt amici, expetita Synopſis hæc noſologiæ methodicæ. Quam, ut expectationi eruditorum pro virili ſatisfacerem, plurimum auctam, ubique emendatam, & uſibus, ut ſpero, medicorum accommodatiorem, exhibui.

Ut omnia fere, ad rem noſologicam ſpectantia jam edita, ſub uno conſpectu hic ponerem, ex ſyſtemate ſymptomatico Clar. MICH. SAGARI, Anno 1776. Viennæ edito, quæ ad genera morborum definienda pertinent excerpta, hic iterum dedi; & ſimul, quæ ex ſcriptis egregij viri DAVIDIS MACBRIDE ad

eum-

eumdem finem conferre poſſent, hic primum addidi.

Quæ porro in re noſologica ipſe conatus ſum, emendatiora, & plurimum aucta, hic protuli; quæ tamen ulterius hic dicenda eſſent, in Prolegomenis, initio tomi hujus operis alterius præfixis, inveniri poſſunt; atque illuc Lectorem ablegamus.

S E.

SERIES CLASSIUM ET ORDINUM.

CLASSIS I. VITIA.

ORDO I. MACULÆ.
II. EFFLORESCENTIÆ.
III. PHYMATA.
IV. EXCRESCENTIÆ.
V. CYSTIDES.
VI. ECTOPIÆ.
VII. PLAGÆ.

CL. II. FEBRES.

ORDO I. CONTINUÆ.
II. REMITTENTES.
III. INTERMITTENTES.

CL. III. PHLEGMASIÆ.

ORDO I. EXANTHEMATICÆ.
II. MEMBRANACEÆ.
III. PARENCHYMATOSÆ.

CL. IV. SPASMI.

ORDO I. TONICI PARTIALES.
II. TONICI GENERALES.
III. CLONICI PARTIALES.
IV. CLONICI GENERALES.

CL. V. ANHELATIONES.

ORDO I. SPASMODICÆ.
II. OPPRESSIVÆ.

CL. VI. DEBILITATES.

ORDO I. DYSÆSTESIÆ.

OR-

ORDO II. ANEPITHYMIÆ.
III. DYSCINESIÆ.
IV. LEIPOSICHIÆ.
V. COMATA.

CL. VII. DOLORES.

ORDO I. VAGI.
II. DOLORES CAPITIS.
III. DOLORES PECTORIS.
IV. DOLORES ABDOMINALES INTERNI.
V. DOLORES EXTERNI ET ARTUUM.

CL. VIII. VESANIÆ.

ORDO I. HALLUCINATIONES.
II. MOROSITATES.
III. DELIRIA.
IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

CL. IX. FLUXUS.

ORDO I. SANGUIFLUXUS.
II. ALVIFLUXUS.
1. *Sanguinolenti.*
2. *Non Sanguinolenti.*
III. SERIFLUXUS.
IV. AERIFLUXUS.

CL. X. CACHEXIÆ.

ORDO I. MACIES.
II. INTUMESCENTIÆ.
III. HYDROPES PARTIALES.
IV. TUBERA.
V. IMPETIGINES.
VI. ICTERITIÆ.
VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

GE-

GENERA MORBORUM

CLASSIS I. VITIA.

CHARACTER. Symptomata cutanea levidenſia, vel mechanicis chirurgiæ auxiliis curanda.

ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

GENUS I. LEUCOMA. 1

Macula opacans corneam.

G. II. VITILIGO. 2

Macula corymboſa, ſeu ex minoribus maculis compoſita, cum depreſſione cutis.

G. III. EPHELIS. 3

Maculæ acquiſitæ, umbrinæ, glabræ, corymboſæ, faciem vel tibias, rarius partes tectas, afficientes.

G. IV. GUTTAROSEA. 4

Maculæ faciei rubræ, guttatæ, parum prominentes, aut aſperæ, & diu permanentes.

G. V. NÆVUS. 5

Macula congenita, quæ vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

G. VI. ECCHYMOMA. 6

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut liveſcens, ſucceſſu temporis flaveſcens, non congenita, nec aſpera, ſed plana, aut parum prominens, & ſubſolitaria.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per puſtulas, papulas, phlyctænas, varos ſimileſve aſperitates.

a. Puſtula. Phyma parvulum apice ruptum.
b. Papula. Phyma parvulum deſquamari ſolitum.
c. Phlyctæna. Veſicula fludio ſeroſo plena.
d. Varus. Tuberculum durum conſtans.

7 G. VII. HERPES.

Efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginoſis, in ſquamas furfuraceas, raro cruſtaceas, abeuntibus.

8 G. VIII. EPINYCTIS.

Phlyctænæ atro-rubræ, aggregatæ trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientes & noctu potiſſimum acriter pungentes.

9 G. IX. PSYDRACIA.

Phymata eryſipelatoſa.

10 G. X. HIDROA.

Exanthemata miliaria plyctænoidea.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, ſolitarii.

11 G. XI. ERYTHEMA.

Tumor ſine febre, ſuperficiarius, ſolitarius, diffuſus, rubro roſeus, preſſione evaneſcens.

12 G. XII. OEDEMA.

Tumor diffuſus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

13 G. XIII. EMPHYSEMA.

Tumor diffuſus, elaſticus, preſſione crepitans, cuti concolor.

G. XIV.

G. XIV. SCIRRHUS. 14

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

G. XV. PHLEGMONE. 15

Tumor ſpheroideus, rubore, calore, tenſione, dolore pulſatili inſignis, ſponte in ſuppurationem vergens.

G. XVI. BUBO. 16

Tumor partim ſcirrhoſus, partim inflammatorius, glandulæ unius aut alterius inguinalis.

G. XVII. PAROTIS. 17

Tumor ſcirrhoſo-phlegmonodeus glandulæ parotidis dictæ in ſuppuratum lentiſſime vergens.

G. XVIII. FURUNCULUS. 18

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, & atro-ruber, cujus centrum, cum ſuppuratus eſt, occupant fibræ craſſæ, quæ in pus non colliqueſcunt.

G. XIX. ANTHRAX. 19

Phyma apice gangrænoſum, ambitu inflammatum.

G. XX CANCER. 20

Tumor durus, tuberoſus, lancinans, pertinaciſſimus.

G. XXI. PARONYCHIA. 21

Phlegmone extremi digiti cum dolore perterebrante.

G. XXII. PHIMOSIS. 22

Phlegmone præputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a ſolidis adauctis, indolentes, lente creſcentes, in ſuppurationem ſponte non abeuntes.

G. XXIII SARCOMA. 23

Excreſcentia carnis conſiſtentiam circiter obtinens.

24 G. XXIV CONDYLOMA.

Excreſcentia firma carnibus durior, oſſibus mollior.

25 G. XXV. VERRUCA.

Excreſcentia cutanea prominens, condylomate minor, ſenſu deſtituta, indolens.

26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excreſcentia carnea, vel membranaceo-vaſculoſa ad oculi canthum exorta, alam expanſam referens, & verſus corneam ſe extendens.

27 G. XXVII. HORDEOULM.

Tumor durus vix ſenſu gaudens, cuti concolor, raro rubens, in palpebrarum limbo enaſcens, ſphæricus, piſo ut plurimum minor.

28 G. XXVIII. BRONCHOCELE.

Excreſcentia vel tumor ſcirrhoſus anticæ partis colli.

29 G. XXIX. EXOSTOSIS.

Tumor oſſis vel totalis vel partialis.

30 G. XXX. GIBBOSITAS.

Oſſium pectoris indecora prominentia a tumore, luxatione, diſtortione, aut alio principio oriunda.

31 G. XXXI. LORDOSIS.

Oſſium diſtortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur oſſa, vel a ſitu deflectunt.

O. V. CYSTIDES.

Protuberantiæ factæ a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quævis diſtendentibus.

32 G. XXXII. ANEURISMA.

Cyſtis arterioſa.

G. XXXIII.

G. XXXIII. VARIX. 33

Cyſtis venoſa.

G. XXXIV. HYDATIS. 34

Cyſtis lymphæductuum.

G. XXXV. MARISCA. 35

Tumores in ani margine enati, rubri, ſæpe dolentes, & cruorem ſæpe fundentes, ſponte dein recedere ſoliti.

G. XXXVI. STAPHYLOMA. 36

Cyſtis aquoſa corneæ proptoſi, & dilatatione, vel ab uveæ hernia trans foramen corneæ elapſa.

G. XXXVII. LUPIA. 37

Cyſtis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

G. XXXVIII. HYDARTHRUS. 38

Cyſtis articuli aquoſa.

G. XXXIX. APOSTEMA. 39

Cyſtis purulenta.

G. XL. EXOMPHALUS. 40

Cyſtis umbilicalis ſæpius aquoſa.

G. XLI. OSCHEOCELE. 41

Cyſtis in ſcroto.

O. VI. ECTOPIÆ.

Proſes, Celes, Pararthremata, *Graec.*
Prolapſus, Herniæ, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*

Partium ſolidarum e ſua ſede dimotio ſenſibus obvia.

G. XLII. EXOPHTHALMIA. 42

Magnitudo nimia, Prolapſus, Expreſſio oculi, *Lat.*
Hygrophthalmia, Elephantiaſis oculi, *Boerh.* de Morb. Ocul. pars II. cap. 5.
Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus ſeu Buphthalmia, Ophthalmoptoſis, Ecpieſmus *Græ-*

corum. *Mauchart*, diſſ. de Hydrophthalmia, & oculi Paracenteſi inter *Haller*. diſput. Chir. T. I.
Groſſeur contre Nature, Hydropiſie, Cancer, Chure de l'oeil. *Maitre-Jan*, part. II. chap. 6.; *Saint Yves*, Part. II. chap. 1.

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata ſenſibiliter nativa ipſius magnitudine.

43 G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii*.

Blepharoptoſis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*
Palpebræ ſuperioris caſus, Retractio, Palpebrarum introverſio, extroverſio, *Lat.*
Chute, relaxation de la paupiere ſuperieure, eraillement des paupieres; trichiaiſe avec introverſion des tarſes, Vide *Platner*. Inſtit. Chirurg. §. 577. §. 584.; *Maitre Jan*, part. III. chap. 18. 19. 20. 21.; *Saint Yves*, part. I. chap. 8. 9. 10: *Dionis*. Dem. 6., *Boerh.* de Morb. ocul. part. I. cap. 5.; *Heiſter*. Chir. *T*. 1. part. II. §. 2. cap. 45. 46. 48.; *Gorter*. Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.

Palpebræ utriuſque vel alterutrius elongatæ, retractæ, introverſæ, vel extroverſæ ectopia.

44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craſpedon, Columella bicornis, *Aretæi*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellæ.
Uvulæ prolapſus. *Nenter*. tab. 25. cap. 8.
Uvula nimium producta, *Heiſter*. Chir. T. 2. p. 659.
Uvulæ inflammatio, catharrus, paralyſis, caſus, *Gorter*, Praxis Med. Syſt. pag. 165.
Relachement de la luette, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis ſeu uvulæ laxatæ, inflammatæ, ulceratæ, incraſſatæ, attenuatæ, bicornis, procidentia,

45 G. XLV. PARAGLOSSE.

Linguæ extumeſcentia, magnitudo, inflatio, *Galen.* Method. med. libr. XIV. *Valeſci de Taranta* Philon. lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat.* Med. Hiſtor. mirab. lib. 3. cap. 4.
Linguæ retractio, exertio, *Gorter*.
Gloſſocele *Gaubii Pathol.* §. 242.; Linguæ extruſio, Idem, §. 254.

Ren-

Renverſement de la langue dans le goſier, *Petit.* Mém. de l' Acad. des Sc. 1742.

Linguæ motu deglutitorio in fauces revolutæ vel ore extruſæ, exundantis, exertæ ectopia.

G. XLVI. PROPTOMA. 46

Partis externæ, etiam ante lapſum conſpicuæ, & a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diverſæ procidentia.

G. XLVII. EXANIA. 47

Proctocele *Pathol. Meth.* edit. 3.
Morbus pœnalis Gerhamenſium, lib. Regum I. cap. 5.
Prolapſus ani *Auctorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II. cap. 2. *Nenteri*, tab. 126. &c.
Chute du fondement *Dionis*, Dem. IV. pag. 392. *Arnaud.* des Hernies, tom. I. chap. 28.; *Levret* obſ. ſur les polypes, ſect. 3. pag. 165.

Sphincteris ani, & inteſtini recti inverſi, procidentia.

G. XLVIII. EXOCYSTE. 48

Prolapſus, inverſio veſicæ urinariæ *Auctorum*; *Salzmanni* diſſ. de Hern. veſicæ inter *Halleri* Diſp. Sel. tom. III.; *Solingen* de mulierum & infant. morb. chir. pag. 741.
Renverſement de la veſſie urinaire. *Noel.* obs; Recherches ſur la Hernie de la veſſie par *Verdier*; Mém. de l' Acad. R. de Chir. tom. 2.

Membranæ tum veſicæ corpus, tum ipſius collum, interne obveſtientis procidentiæ per meatum urinarium facta.

G. XLIX. HYSTEROPTOSIS. 49

Hyſteroceles nudæ *Pathol. Method.* Edit. 3.
Relaxatio, prolapſus, procidentia, inverſo uteri vel vaginæ *Auctorum*, ut *Heiſteri* Inſt. chir. tom. II.; *Gunzii* de Herniis, &c.
Relachement, chute, deſcente, renverſement de la matrice ou du vagin. *Arnaud*, tom. 1. chap. 24. &c.; *Puzos* ſur les maladies de la matrice; *Sabatier*, Mém. de l' Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginæ procidentia.

50 G. L. ENTEROCELE.

Hernia inteſtini.

51 G. LI. EPIPLOCELE.

Hernia Omenti.

52 G. LII. GASTROCELE. *Ign. la Chauſſe.*

Hernia ventriculi, *Faber. Hildani* reſp. ad Doring. pag. 915. ; *Blegney* Zod. med. Gall. ann. I. Feb. Obſ. 2. pag. 44.; *Gunzii* libell. de hern. cap. 20. *Ign. La Chauſſe* Diſſ. de hernia ventrali, & *Kirſchbaum* Diſſ. de hern. ventriculi in diſp. Chir. Haller. tom. 3. Diſſ. 68. 69.

Hernie de l' eſtomac, *La Faye* ſur *Dionis*, pag. 121.; *Arnaud.* Tr. des hernies, préface, p. 81.; *Sharp* Rech. Crit. chap. I.; *Garengeot*, Mém. de l' Acad. R. de Chir. T. 1. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigaſtricæ parietes, imo & per umbilici annulum elapſi ectopia hernioſa.

53 G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* Libell. de hern. p. 4.

Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I. Ann. II. & Dec. II. Ann. VII.; *Bohnii* Chir. rational. pag. 230.

Hernie du foye, *Arnaud* des hern. tom. 1.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipſum umbilicum ectopia hernioſa.

54 G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Libell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, *Faber. Hildani* epiſt. LV. pag. 999.; *Spigelii* de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14.; *Ruyſchii* Adverſ. Anat. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Rate, *Arnaud* des hern. tom. 1. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere ſiniſtro parietes, vel per inguinalem ejuſdem lateris annulum elapſi ectopia hernioſa.

55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert.* Lib. 4. Med. Pract. part. II. ſect.

ſect. II. cap. 17.; *Doringii* Epiſt. ad G. Faber. Hildanum de hernia uterina, p. 893.: *Graaf.* de mulier. organ. cap. 8.; *Ruyſch.* Adv. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies. T. I. pag. 29.; *Sabatier* Mém. de l' Acad. Real. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapſi ectopia herniosa.

G. LVI. CYSTOCELE, *Platner*. Inſt. Chir. 56 *Ign. La Chauſſe* de hern. ventrali.

Hernia cyſtica *quorundam*.

Hernia veſicæ urinariæ *Salzmanni* Diſſ. inter *Halleri* Diſp. Chir. Tom. III. Diſſ. 72.; *Gunzii* Libell. de Hern. &c.

Hernie de la veſſie urinaire *Mery*. Mém. de l' Acad. R. des Sc. 1713., *Garengeot* Oper. de Chir.; *Levret* Obſ. ſur les polpes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mém. de l' Acad. R. de Chir. T. II.

Veſicæ urinariæ trans annulos inguinales, ſub arcubus cruralibus, & per laxatos, diductos perinæi, hypogaſtrii, necnon vaginæ parietes elapſæ ectopia herniosa.

G. LVII. ENCEPHALOCELE, *Corvini* 57 Diſſ. de hern. Cerebri inter *Halleri* Diſp. Chir. T. 2. Diſſ. XLVI.

Hernia cerebr., *Reiſelii* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II. Obſ. 115.; *Lechelii* ibid. Obſ. 158.; *Treu* Comm. Litt. 1738., Hebd. 52. n. 3.; *Taconi* Diſſ. de humano monſtro Bononiæ nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obſ. de Chir. Obſ. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriuſque, verbo Encephali, per oſſium cranii non penitus oſſificatorum hiatum prorumpentis, ectopia herniosa.

G. LVIII. HYSTEROLOXIA. 58

Obliquitates uteri *Rœdereri*, Elem. art. obſtetric. §. 449. — 507.; *Levret* Obſerv. ſur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*, cap.

cap. 46. 47. 48. : *Ruyſchii*, Obſerv. XCVIII.
Inclinaiſon, obliquitè de la matrice, *Sabatier*, Mém. de l' Acad. de Chir. tom. III. &c.

Uteri, ſæpius gravidi, & contra quam in hyſterocele fit, abdominis clauſtris contenti ſitus in obliquum errans.

59 G. LIX. PARORCHIDIUM.

Teſticulorum ſerior deſcenſus, vel retractio, *Felic. Plateri* Mantiſſ. Obſerv.; *Ambr. Paraei* Lib.vii; *Thom. Bartholini* Hiſt. Anat.; *Morgagn.* Adverſ. IV.; *Dionis* Oper. de Chir. Dem. IV. *Quelmalzii* inter Halleri Diſput. Anatom. T. V. Diſſert. I.; *Verdier* ſur la Hernie de la Veſſie, Mém. de l' Acad. R. de Chir. tom. II.

Teſticuli unius, vel utriuſque, cujus poſt nativitatem ſedes naturalior ſcrotum eſt, ſitus in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, *Græc.*

Exarthroſis, Parathrema *eorund.*
Luxatio, ſubluxatio, diſtortio, *Heiſter.* Inſt. Chir. T. 1., *Boerh.* Aph. comment. T. I.; *Gorter.* Chir. repurgat. cap. VI. *Platner.* Inſtit. Chir. §. 1090 — 1213.
Luxation, entorſe, *Petit.* Malad. des os, T. II., *Coll. de Villars* Chir. T. V.; *de la Faye* Princ. de Chir.: *Duverney* Malad. des Os, tom. II.

Separatio contigui in oſſium articulis diarthroſice, non vero immobiliter combinatis.

61 G. LXI. DIASTASIS, *Græcorum*.

Oſſium receſſus, *Latin.*; *Petit* T. II. chap. 8. & 13., *La Faye* Prin. de Chir. pag. 474. *Duvernoy* T. II. ch. 1. & 5.

Oſſium cartilaginum, immobiliter combinatorum, ſeparatio, ſeu receſſus ab invicem partialis vel totalis.

62 G. LXII. LOXARTHRUS.

Perverſio capitis oſſium ac muſculorum appenſorum, *Duverney*, T. II. cap. II.
Artis vari *Duverney*, T. II. cap. II.
Gibboſitas ſcapularis *Auctorum*.

Oſ-

Oſſium cum motu ſenſibili articulatorum ſitus relativus in alienum conſtanter mutatus, aut obliquitas reſpectiva perſiſtens citra exarthrema & ſpaſmum.

O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

G. LXIII. VULNUS. 63

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem ſuppurationemque tendens.

G. LXIV. PUNCTURA. 64

Continui ſolutio intus tantum extenſa.

G. LXV. EXCORIATIO. 65

Cuticulæ vel cutis a carnibus ſubjectis ſeparatio.

G. LXVI. CONTUSIO. 66

Textus carnoſi, potiſſimum infra cutem, ruptio per minima puncta & vaſorum contritio, ecchymoma ſæpius inferens.

G. LXVII. FRACTURA. 67

Separatio violenta & mechanica oſſis in fragmenta invicem non cohærentia.

G. LXVIII. FISSURA. 68

Separatio oſſis in duas partes rima tantum diſſitas, & alterutro ſaltem extremo cohærentes.

G. LXIX. RUPTURA. 69

Tendinum vel ligamentorum aut cartilaginum ſolutio, vel vehemens diſtractio, cum vel ſine exarthremate.

G. LXX. AMPUTATURA. *Ill. Linn.* G. 241. 70

Solutio continui in partibus tum mollibus, tum oſſeis, cum artus, articuli, vel partis totali ſeparatione a reſiduo trunco.

71 G. LXXI. ULCUS.

Partium mollium eroſio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroſo vel utcumque vitioſo.

72 G. LXXII. EXULCERATIO.

Excoriatio ulceroſa ſuppurans.

73 G. LXXIII. SINUS.

Cavitas ulceroſa, cujus fundus amplus, ſæpe multiplex deſinit in anguſtum orificium.

74 G. LXXIV. FISTULA.

Cavitas ulceroſa, ſinuoſa, cujus parietes calloſi ſunt ut plurimum, aut fundus ad os carioſum, arthrocace corruptum, pertingit.

75 G. LXXV. RHAGAS.

Solutio continui ſicca in partium marginibus.

76 G. LXXVI. ESCHARA.

Cruſta ſicca, mortua, fluidis ſolidiſque corporis humani coagmentata.

77 G. LXXVII. CARIES.

Oſſis ſuo perioſteo denudati decoloratio, aſperitas, exfoliatio & ſubſequens fragilitas ac eroſio.

78 G. LXXVIII. ARTHROCACE.

Ulcus medullæ oſſium, ſæpius in epiphyſibus, cum carie, exoſtoſi, & dolore.

GL. II. FEBRES.

Pulſus magnitudo & frequentia cum frigore in inſultu, fervore in decurſu, madore in declinatione, & ſemper virium proſtratione majori quam a virium vitalium gradu foret exſpectandum.

OR-

ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis a frigore ſæpius exordiens ſine exacerbatione partiali, & ſine acceſſu, non pluries quam ſemel vel bis in menſe revertens, aduſque finem ægritudinis perſeverat.

G. I EPHEMERA. 79

Decurſus ægritudinis intra dimidiam ſeptimanam abſolvitur. Vigor morbi ſubito accedit.

G. II. SYNOCHA. 80

Decurſus intra ſeptimanam, incrementum ſucceſſivum.

G. III. SYNOCHUS *Galeni*. 81

Decurſus ad duas treſve ſeptimanas, cum pulſus robore ſanum, in morbi ſtatu ſaltem, notabiliter ſuperante.

G. IV. TYPHUS *Hippocratis* 1. & 2. de intern. affect. Foeſii 553. 82

Decurſus ultra duas ſeptimanas, ſæpius tres, cum calore & urina ſanorum ſimilibus, pulſuque quoad frequentiam ſano fere ſimili, & quoad robur non majori, artubus interea maxime proſtratis.

G. V. HECTICA *Galeni & ejus Sequacium*; *Sydenhami*, p. 524. 83

Decurſus ultra menſem, debilitas parva, pyrexia exigua, cum pulſu poſt paſtum frequentiori.

O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decurſu morbi creſcit & decreſcit, non omnino recedit, typus ſæpe confuſus.

G. VI. AMPHIMERINA. 84

Remiſſio quotidianæ typum ſervat. Exacerbationes cum horrore,

85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Remiſſionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remiſſio quartanæ typum ſervans.

O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia plures in decurſu ægritudinis deſerit & recurrit, cum intervallis lucidis.

87 G. IX. QUOTIDIANA.

Acceſſus ſimiles quolibet die accidunt.

88 G. X. TERTIANA.

Acceſſus ſimiles alternis diebus revertuntur.

89 G. XI. QUARTANA.

Acceſſus ſimiles duobus interpoſitis diebus redeunt.

90 G. XII. ERRATICA.

Acceſſus ſimiles diſtantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

CL. III. PHLEGMASIÆ *Galeni*.

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneæ cum pyrexia ſæpius maligna, quandoque lenta.

91 G. I. PESTIS.

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhods.

92 G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis Jouberti*, & *antiquorum*.

Eruptio puſtularum phlegmonodearum in ſuppurationem tendentium.

G. III.

G. III. PEMPHIGUS. 93

Eruptio phlyctænarum avellanæ circiter magnitudine ſero dilute flavo turgidarum.

G. IV. RUBEOLA, ſic primitus nominata a traductoribus *Haly Abbatis* Practicæ, lib. 3. c. I. de Variolæ & Rubeolæ Medela. 94

Eruptio papularum in ſquamulas furfuraceas abeuntium. Præcedunt tuſſis ſicca, ſternutatio, lachrymatio, & febris catarrhalis.

G. V. MILIARIS. 95

Eruptio phlyctænarum mili ſemini non majorum.

G. VI. PURPURA. 96

Eruptio maculoſa purpurea, livida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente febre.

G. VII. ERYSIPELAS. 97

Eruptio erythematis cum ſynocha febre.

G. VIII. SCARLATINA. 98

Eruptio maculoſa, rubra, pruriens, papuloſa, lata, parum uniformis, in ſquamulas furfuraceas abiens, ſed ſine præludio catarrhali, & ſæpe ad ſecundam tertiamvem vicem ſe prodens ac rerecondens viciſſim.

G. IX. ESSERA. 99

Eruptio ut plurimum apyreta, ſuperyſipelatoſa, ſubito accedens per vices & recedens.

G. X. APHTHA. 100

Eruptio puſtuloſa, phlyctænodes, & ulceroſa, in ore aut pudendis.

O. II. MEMBRANACEÆ.

Pyrexia magna typo ſynochæ vel ſynochi cum dolore viſceris cujuſdam.

G. XI. PHRENITIS. 101

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum, pulſuſque major, pyrexia acuta.

G. XII.

102 G. XII. PARAPHRENESIS.

Symptomata phrenitidis & peripneumoniæ.

103 G. XIII. PLEURITIS.

Dolor lateris, reſpiratio & pulſus frequens, tuſſis

104 G. XIV. GASTRITIS.

Dolor epigaſtrii, nauſea, vomituritio, febris typhodes, vel remittens maligna.

105 G. XV. ENTERITIS.

Dolor circa umbilicum vehemens, cum meteoriſmo, pyrexia acuta, ileo, vel dyſenteria.

106 G. XVI. EPIPLOITIS.

Dolor circa hypocaſtrium. & umbilicum juxta epiploi extenſionem.

107 G. XVII. METRITIS.

Dolor & tumor in regione & extenſione uteri ac lumbis & inguinibus cum febre.

108 G. XVIII. CYSTITIS.

Dolor, tumor, tenſio hypogaſtrii, cum dyſuria, vel iſchuria.

O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtuſus, calor & tumor in viſceribus farctis, non ſacciformibus cum pyrexia acuta, ſuppurationis apparatu.

109 G. XIX. CEPHALITIS.

Febris acuta cum delirio ſomnolento, & carphologia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Dolor gutturis cum dyſpnœa ſtrangulante, dyſphagia, & pyrexia acuta.

111 G. XXI. CARDITIS.

Dolor ſub ſterno, pulſus inæqualis, frequens, palpitatio, & cardialgia, cordis anxietas.

G. XXII.

G. XXII. PERIPNEUMONIA. 112

Pyrexia acuta, dyſpnœa gravis, gravativus pectoris dolor, tuſſis cruenta, pulſus mollis.

G. XXIII. HEPATITIS, *Galeni.* I. Epid. Comm. 3. 113

Dolor, tenſio, calor in regione hepatis, cum pondere, tuſſi ſicca, reſpiratione difficili.

G. XXIV. SPLENITIS. 114

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans, cum febre ut plurimum remittente.

G. XXV. NEPHRITIS. 115

Dolor acutus in regione renum juxta ureteres in veſicam directus, cum febre acuta, dyſuria, iſchuriave, &c.

CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, conſtans vel interpolata, muſculorum organis locomotivus, non vitalibus inſervientium.

O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas & immobilitas artus vel organi determinati.

G. I. STRABISMUS. 116

Oculi ſpaſmus axium opticorum divergentiam inferens.

G. II. TRISMUS. 117

Maxillæ inferioris ſpaſmus, tonicus, vel clonicus.

G. III. OBSTIPITAS. 118

Colli ſpasmus tonicus, capitis nativam mobilitatem & directionem mutans.

G. IV. CONTRACTURA. 119

Artus cujuſdam, ut brachii, vel cruris, conſtans, diuturna, rigiditas ſenſim exorta.

120 G. V. CRAMPUS.

Subitanea, fugax, dolorifica muſculi rigiditas.

121 G. VI. PRIAPISMUS.

Penis injucunda rigiditas.

O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

122 G. VII. TETANUS.

Spaſmus generalis ſubito ortus cum dyſpnoea.

123 G. VIII. CATOCHUS.

Spaſmus generalis ſenſim factus ſine dyſpnœa.

O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita & coacta cujuſdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

124 G. IX. NYSTAGMUS.

Spaſmus clonicus oculi, palpebræve.

125 G. X. CARPHOLOGIA.

Motus velut convulſivus manuum, quo ægri floccos e veſtibus evellere, paleas colligere, muſcas venari, &c. videntur.

126 G. XI. PANDICULATIO.

Diſtenſio ſemivoluntaria plurium vel omnium ſucceſſive membrorum, ut plurimum cum oſcitatione.

127 G. XII. APOMYTTOSIS.

Succuſſio cutis & capitis tremula, violenta, cum expiratione ſonora, quaſi ſtertoroſa.

128 G. XIII. CONVULSIO.

Agitatio invita artus vel muſculi brevis & ſuperſtite in paroxyſmis animæ functionum exercitio.

G. XIV.

G. XIV. TREMOR. 129

Artus alterna per itus & reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

G. XV. PALPITATIO. 130

Pulſatio in regione cordis pulſui arteriarum numero, minime vero intenſitate, reſpondens.

G. XVI. CLAUDICATIO. 131

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci ſenſibiliter, dextrorſum vel ſiniſtrorſum transfertur.

O. IV. CLONICI GENERALES.

Spaſmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extenſi.

G. XVII. RIGOR. 132

Totius cutis ſuccuſſio frigorifera.

G. XVIII. ECLAMPSIA. 133

Artuum vel muſculorum plurimorum ſpaſmus clonicus acutus, cum ſenſuum obſcuratione.

G. XIX. EPILEPSIA. 134

Spaſmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum ſenſuum obſcuratione.

G. XX. HYSTERIA. 135

Artuum, organorumque etiam internorum ſpaſmus clonicus, tonicuſve, paroxyſmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intenſiſſima.

G. XXI. SCELOTYRBE. 136

Motus ſemivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, geſticulationem, aut ridiculam hiſtrionis feſtinationem referens.

G. XXII. BERIBERIA. 137

Motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis ſenſu, vocis raucedine, Indis familiaris.

CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, muſculorum pectoris, unde reſpiratio difficilis, frequens, ſine febre acuta.

O. I. SPASMODICÆ.

Inſultus fugaces, ſed ſæpius iterati ſpaſmodicorum motuum pectoris cum expiratione ſonora.

138 G. I. EPHIALTES.

Anhelatio difficilis, querula, cum insomnio terrifico.

139 G. II. STERNUTATIO.

Concuſſio violenta pectoris, cum exſpiratione veloci narium interiora everrente & ſonora.

140 G. III. OSCEDO.

Diutina lenta profunda inſpiratio, ore hiante, ſæpius cum pandiculatione.

141 G. IV. SINGULTUS.

Concuſſio diaphragmatis cum inſpiratione ſubito interrupta, ſonora.

142 G. V. TUSSIS.

Concuſſio ſonora, violenta pectoris cum expiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

O. II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, ſed conſtantes reſpirandi difficultates, cum pectoris non raro oppreſſione, frequenti anhelitu, difficultate illius ſuſpendendi, ſine metu ſuffocationis.

143 G. VI. STERTOR.

Reſpiratio inter inſpirandum, ſonum gravem, tremulum, in gutture edens, ſæpe cum alterno ſibilo.

G. VII.

G. VII. DYSPNOEA. 144

Difficultas reſpirandi chronica, non intermittens, ſine ſignis hydrothoracis vel empyematis.

G. VIII. ASTHMA. 145

Difficultas reſpirandi periodi recurrens, chronica.

G. IX. ORTHOPNOEA. 146

Præceps ut plurimum & acuta reſpirandi difficultas.

G. X. ANGINA. 147

Difficultas reſpirandi, cum ſenſu obicis in gutture, & ſæpe deglutitione difficili, ſine phlegmaſia.

G. XI. PLEURODYNE. 148

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum reſpirandi difficultate citra phlegmaſiam acutam.

G. XII. RHEUMA. 149

Difficultas reſpirandi cum ſenſu gravitatis in pectore, quam comitantur vel præcedunt, coryza, ſternutatio, raucedo, &c.

G. XIII. HYDROTHORAX. 150

Difficultas reſpirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum & pedum œdemate, ſymptomatibus ephialticis, alterutrius brachii ſtupore & ægritudine chronica non remittente.

G. XIV. EMPYEMA. 151

Symptomata hydrothoracis, prægreſſa pulmonis inflammatione ſuppurata & comitante febre hectica.

CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare ac diſtincte ſentiendi, appetendi, conſueta vi artus organave movendi, nec non imaginandi, vigilandi, &c.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac diſtincte ſentiendi ſine ſopore.

152 G. I. CATARACTA.

Viſus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

153 G. II. CALIGO.

Viſus debilitas obicibus opacis citra pupillam poſitis.

154 G. III. AMBLYOPIA.

Viſus debilitas reſpective ad ſitum, gradum lucis, diſtantiam objecti, oculis pellucidis.

155 G. IV. AMAUROSIS.

Viſus debilitas abſoluta ſine ulla organorum opacitate inaſſueta.

156 G. V. ANOSMIA.

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

157 G. VI. AGHEUSTIA.

Guſtus debilitas aut guſtandi impotentia.

158 G. VII. DYSECÆA.

Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum poſitis.

159 G. VIII. PARACUSIS.

Voces articulatas diſtincte audiendi difficultas vel impotentia.

160 G. IX. COPHSOIS.

Sonos etiam ſimplices percipiendi vel audiendi difficul-

ficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum poſito.

G. X. ANÆSTHESIA. 161

Tactus in toto corpore debilitas vel obſcuritas ſine ſtupore & ſopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum ſenſitivorum debilitas notabilis, vel ſuppreſſio inſolita ſine ſopore.

G. XI. ANOREXIA. 162

Appetitus eſculentorum ſuppreſſio, ſeu famis feriatio.

G. XII. ADIPSIA. 163

Appetitus potulentorum ſuppreſſio ſeu ſitis feriatio.

G. XIII. ANAPHRODISIA. 164

Appetitus venereorum, ſeu libidinis ſuppreſſio.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia motus ac ſæpe ſenſus in organis libertati ſubditis, ut lingua, larynge, artubus.

G. XIV. MUTITAS. 165

Voces articulatas edendi impotentia.

G. XV. APHONIA. 166

Plenaria vocis ſuppreſſio, citra ſtuporem & ſyncopem.

G. XVI. PSELLISMUS. 167

Quaſdam ſyllabas literaſve pronunciandi impotentia.

G. XVII. PARAPHONIA. 168

Vocem ſolitam edendi impotentia.

G. XVIII. PARALYSIS. 169

Motus aut tactus, vel utriuſque in uno tantum artu debilitas.

170 G. XIX HEMIPLEGIA.

Debilitas motus aut tactus vel utriuſque in alterutro corporis latere.

171 G. XX. PARAPLEXIA.

Debilitas ſenſus & motus in dimidio corporis tranſverſim ſumpti.

O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

172 G. XXI. ASTHENIA.

Totius corporis gradaria ſeu ſucceſſiva debilitas ſenſubus integris.

173 G. XXII. LEIPOTHYMIA.

Virium muſcularium totius corporis ſubitanea imminutio, pulſu ſuperſtite.

174 G. XXIII. SYNCOPE.

Motuum vitalium ſubitanea debilitas cum frigore, pallore, ſenſuumque obſcuratione.

175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Omnium motuum & ſenſuum apparens ceſſatio mortem fere referens.

O. V. COMATA.

Senſus omnis, appetitus, motus liberi, phantaſiæ, memoriæque feriationes.

176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status ſoporoſus cum artuum flexilitate & ad quoſvis novos ſitus retinendos aptitudine.

177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status ſoporoſus a gravi pathemate ſubito ortus, ægrum in eodem ſitu quo prehenſus eſt retinens, ſine aptitudine cataleptica.

G. XXVII.

G. XXVII. TYPHOMANIA. 178

Apparens ſopor cum pervigilio reali, vel ſopor levis, e quo ægri facile excitantur, cum delirio comitante.

G. XXVIII. LETHARGUS. 179

Status ſoporoſus facile excitabilis cum ſummo imaginationis & memoriæ torpore ac febre.

G. XXIX. CATAPHORA. 180

Status ſomnolentus facile excitabilis ſine febre, delirio, & oblivione.

G. XXX. CARUS. 181

Sopor profundus ſine ſtertore.

G. XXXI. APOPLEXIA. 182

Sopor profundiſſimus cum ſtertore vel ſonora reſpiratione.

CL. VII. DOLORES.

Cujuſvis experientia cognoſcendi, nulla definitione diſtincte explicabiles ſunt.

O. I. VAGI.

Dolores & moleſtiæ vagæ ſæpius univerſales aut cutaneæ ad phlegmaſias non referendæ.

G. I. ARTHRITIS. 183

Articulorum dolor ſpontaneus periodicus.

G. II OSTOCOPUS, *Gorræi* definit: 184

Oſſium dolor non erraticus & internus in artubus.

G. III. RHEUMATISMUS. 185

Dolor diuturnus in parte carnoſa artuum.

G. IV.

186 G. IV. CATARRHUS.

Collo vicinarum partium dolor a frigore ſuſcepto, cum tuſſi, coryza, &c.

187 G. V. ANXIETAS.

Moleſtia quæ ad continuam loci mutationem cogit.

188 G. VI LASSITUDO.

Moleſtia cum debilitate quæ ad quietem invitat.

189 G. VII. STUPOR.

Moleſtia quæ ſenſum tactus obſcurat.

190 G. VIII. PRURITUS.

Moleſtia quæ ad ſcalpendum nos cogit.

191 G. IX. ALGOR.

Moleſtia qualis a ſummo aeris frigore excitatur.

192 G. X. ARDOR.

Moleſtia qualis a ſummo aeris calore producitur.

O. II. DOLORES CAPITIS.

Scilicet vel capillitii vel faciei.

193 G. XI. CEPHALALGIA.

Gravativus capitis dolor.

194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tenſivus capitis dolor.

195 G. XIII. HEMICRANIA.

Dolor alterutrius lateris frontis.

196 G. XIV. OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia & lachrymatione.

197 G. XV. OTALGIA.

Dolor aurium.

198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

O. III.

O. III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis & œſophagi, anhelationis expertes.

G. XVII. DYSPHAGIA. 199

Moleſtia deglutitionem impediens ſine notabili reſpirationis læſione.

G. XVIII. PYROSIS. 200

Senſus ardoris in ventriculo & æſophago ſine febre acuta.

G. XIX. CARDIOGMUS. 201

Gravis pertinaxque moleſtia in præcordiis, cum ſenſu ponderis & magnæ molis pulſantis a minimo motu increſcens.

O. IV. DOLORES abdominales Interni.

G. XX. CARDIALGIA. 202

Moleſtia in ſtomacho ſyncopem minitans.

G. XXI. GASTRODYNIA. 203

Quicumque dolor notabilis & conſtans in regione ſtomachi, qui continua animi defectione non ſtipatur cardialgia, nec pyrexia ut gaſtritis.

G. XXII. COLICA. 204

Dolor inteſtinorum.

G. XXIII. HEPATALGIA. 205

Moleſta ſenſatio, gravativa, tenſiva, aut alia quævis in regione hepatis, ſine pyrexia acuta.

G. XXIV. SPLENALGIA. 206

Dolor aut moleſtia in regione lienis ſine pyrexia acuta.

G. XXV. NEPHRALGIA *Zwingeri*. 207

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum ſequens, cum nauſea, teſtis retractione in viris, cruris ſtupore in fœminis, &c.

G. XXVI.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA *Montaltì*.

Dolor uteri ſine niſu parturitionis.

O. V. DOLORES Externi & Artuum.

210 G. XXVIII. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

211 G. XXIX. RACHIALGIA *Aſtrucii*.

Dolor abdominis & ſpinæ dorſi in brachiorum paralyſin aut convulſiones deſinens.

212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

213 G. XXXI. ISCHIAS.

Pelvis & coxendicis dolor claudicationem ſæpius inducens.

214 G. XXXII. PROCTALGIA.

Dolor podicis citra teneſmum.

215 G. XXXIII. PUDENDAGRA.

Dolor genitalium citra dyſuriam.

CL. VIII. VESANIÆ.

Error in imaginatione, appetitu, vel judicio.

O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis ſalvo intellectu ab organorum externorum vitio.

216 G. I. VERTIGO.

Objecta licet quieſcentia e loco moveri vel in gyrum

rum verſari nobis videntur. Ipſe æger ſibi quandoque nutare videtur.

217 G. II. SUFFUSIO.

Objectorum, quæ non ſunt, imaginaria viſio.

218 G. III DIPLOPIA.

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

219. G. IV. SYRIGMOS.

Auditio imaginaria ſoni, cujus nullum eſt extra aures principium.

220 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Morbus diuturnus quo affectus ſe in mortis periculo verſari ex ructu, palpitatione, aliiſque levidenſibus malis, imaginatur.

221 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Somniantes e lecto ſurgunt, vigilantium munia exſequuntur, & ſe ſæpe diverſis periculis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut averſationes depravatæ.

222 G. VII. PICA.

Alimentorum conſuetorum averſatio, cum inaſſuetorum, ſaniſque inſalubrium, appetitu.

223 G. VIII. BULIMIA.

Appetitus eſculentorum copiæ majoris quam quæ digeri poſſit.

224 G. IX. POLYDIPSIA.

Appetitus majoris ſolito copiæ potulentorum.

225 G. X. ANTIPATHIA.

Quorundam objectorum tanta averſatio ut ex eorum viſu, vel olfactu æger gravia ſymptomata patiatur.

226 G. XI. NOSTALGIA.

Parentum patriæve tanta cupiditas, ut hac non expleta æger gravi morbo decumbat.

G. XII.

227 G. XII. PANOPHOBIA.

Summus pavor inter dormiendum ſine cauſa evidenti.

228 G. XIII. SATYRIASIS.

Effrænis, impudenſque veneris cupiditas cum libidinoſa penis tentigine.

229 G. XIV. NYMPHOMANIA.

In fœminis effræne veneris deſiderium.

230. G. XV. TARANTISMUS.

Effrænis choreas agendi, vel ſaltandi cupiditas.

231 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Effrænis potulentorum averſatio, ſæpius a morſu animalis rabidi.

O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

232 G. XVII. PARAPHROSYNE.

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

233 G. XVIII. AMENTIA.

Delirium univerſale mite, ſine furore & audacia, cum morbo diuturno.

234 G. XIX. MELANCHOLIA.

Delirium particulare, mite, cum mœrore, ac morbo diuturno.

235. G. XX. MANIA.

Delirium univerſale cum furore, vel audacia & morbo diuturno.

236 G. XXI. DÆMONOMANIA.

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiæ tribuitur.

O. IV.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

G. XXII. A M N E S I A. 237

Omnis memoriæ feriatio.

G. XXIII. A G R Y P N I A. 238

Pervigilium continuum immodicumve.

CL. IX. F L U X U S.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quæ quantitate, qualitate, deſuetudine notabilis eſt.

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis vel ſanguinolentæ materiæ ejectio ſine alvi fluxu.

G. I. HÆMORRHAGIA. 239

Fluxus ſanguinis e naribus.

G. II. H Æ M O P T Y S I S. 240

Sanguinis expectoratio cum tuſſi ſine pyrexia acuta.

G. III. S T O M A C A C E. 241

Fluxus ſanguinis e gingivis ſæpius fœtidis putridiſve.

G. IV. HÆMATEMESIS. 242

Sanguinis rejectio ex œſophago cum vomitorio conatu.

G. V. H Æ M A T U R I A. 243

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emiſſio.

G. VI. M E N O R R H A G I A. 244

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitioſus.

G. VII. A B O R T U S. 245

Fœtus immaturi, ſæpius cum menorrhagia ex utero excluſio.

O. II.

O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitioſa per os aut anum rejectio.

I. *Alvifluxus ſanguinolenti.*

246 G. VIII. HEPATIRRHOEA.

Alvifluxus per inferiora ſeroſo-cruentus nec ater nec torminoſus.

247 G. IX. HÆMORRHOIS.

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariſcis ruptis obſito.

248 G. X. DYSENTERIA.

Frequens torminoſa, ſæpe teneſmodes, fœcum cruentarum per inferiora dejectio.

249 G. XI. MELÆNA.

Fluidi atri per ſuperiora, vel inferiora frequens rejectio.

II. *Alvifluxus non ſanguinolenti.*

250 G. XII. NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, & flatus tantum per os emiſſio; affinis eſt aeri fluxibus.

251 G. XIII. VOMITUS.

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, œſophagumque rejectio frequens.

252 G. XIV. ILEUS.

Atrox circa epigaſtrium dolor, ſeu gaſtrodynia, alvi conſtipatio, & fœculentæ demum materiæ vomitio.

253 G. XV. CHOLERA.

Vomitio biliosa aut acris aſſidua & diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium proſtratione, & non raro ſurarum crampis.

254 G. XVI. DIARRHOEA.

Excrementitiorum humorum frequens, vel intempeſtivo dejecto.

G. XVII.

G. XVII. COELIACA. 255

Albeſcentium, aut chilacearum materierum dejectio.

G. XVIII. LIENTERIA. 256

Celeris ſtatim a paſtu facta ingeſtorum, vix mutatorum dejectio.

G. XIX. TENESMUS. 257

Muci pauci frequens dejectio cum intenſa dejiciendi cupiditate, & aſſiduo conatu.

O. III. SERIFUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

G. XX. EPHIDROSS *Hippocratis*. 258

Sudoris quantitate, qualitate, intempeſtivitate peccantis effluxus.

G. XXI. EPIPHORA. 259

Vitioſus ex oculis humoris lachrymalis, ſebacei, vel purulenti effluxus.

G. XXII. CORYZA, *Hippoc. Gorræi*. Def. Med. 260

Humoris ſeroſi, mucoſive e naribus effluxus ſine ozæna, ſæpius cum gravedine.

G. XXIII. PTYALISMUS. 261

Salivæ vel muci ſine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emiſſio.

G. XXIV. ANACATHARSIS, *Hippocr. Galen.* in Aph. 8. lib. 5. 262

Muci, lymphæ, vel cujuscumque humoris facta cum tuſſi expectoratio conſtans & notabilis.

G. XXV. DIABETES. 263

Subito poſt paſtum potulentorum cum magna ſiti per urinæ vias emiſſio.

G. XXVI. ENURESIS. 264

Involuntaria, doloris & ardoris expers, mictio.

265 G. XXVII. D Y S U R I A.

Difficilis & dolorifica, ſæpius ardens, urinæ emiſſio.

266 G. XXVIII. P Y U R I A.

Purulentæ, albeſcentis, aut viſcido-mucoſæ materiei mictio.

267 G. XXIX. L E U C O R R H O E A, *Caſtell.* Lex *Bonet.* Anat. Pr. Lib. 3.

Seroſo-flavæ, vel puriformis materiæ ex utero delapſus.

268 G. XXX. G O N O R R H O E A.

Stillicidium fluidi ſeminalis ex urethra, aut ex vagina.

269 G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D. Cuſſon.*

Seminis in actu venerea ſtillatitia, tarda, impedita, & ad generationem inſufficiens emiſſio.

270 G. XXXII. GALACTIRRHOEA.

Stillicidium lactis ex mammis.

271 G. XXXIII. O T O R R H O E A. *Linn.* gen.

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte poſtica.

O. IV. A E R I F L U X U S.

Flatus, halituſve vitiosa emiſſio.

272 XXXIV. F L A T U L E N T I A.

Flatuum ex primis viis per ſuperiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis ſtipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam vel uterum emiſſio.

274 G. XXXVI. D Y S O D I A.

Miaſmatum fœtidorum exhalatio.

CL.

CL. X. CACHEXIÆ.

Coloris, figuræ, molis in corporis habitu depravatio.

O. I. MACIES.

Corporis partium mollium extenuatio.

G. I. TABES. 275

Macies cum amphimerina lenta ſine tuſſi.

G. II. PHTHISIS, *Græc.* 276

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tuſſi, dyſpnœa, & ut plurimum puris ſputo.

G. III. ATROPHIA. 277

Macies ſine febre.

G. IV. ARIDURA, *Etmulleri.* 278

Macies unius tantum partis.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

G. V. POLYSARCIA. 279

Intumeſcentia univerſalis ab adipe moleſta & corporis agilitatem minuens.

G. VI. PNEUMATOSIS. 280

Elaſtica & flatulenta cutis intumeſcentia.

G. VII. ANASARCA. 281

Cutis totius intumeſcentia, mollis, pallida, non elaſtica.

G. VIII. PHLEGMATIA. 282

Artuum inferiorum turgeſcentia mollis, non elaſtica, cuti concolor, indolens.

G. IX. PHYSCONIA. 283

Intumeſcentia abdominis a partibus ſolidis ſine gravitate & fluctuatione.

284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumeſcentia abdominis ab hypogaſtrio incipiens, opus generationis ſubſequens & partu terminanda.

O. III. HYDROPES PARTIALES.

Tumores majores ſed non univerſales, a fluido intra cavum capitis, abdominis, uteri vel veſicæ contento.

285 G. XI. HYDROCEPHALUS.

Tumor capitis, facie ſæpius excepta, mollis aut elaſticus, a fluidi intra ipſum congeſtione.

286 G. XII. PHYSOCEPHALUS.

Tumor totius capitis tenſus elaſticus ſub digito crepitans.

287 G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni*.

Tumor cyſticus ſero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans cum anæſtheſia.

288 G. XIV. ASCITES.

Hydrops totius abdominis a fluido non elaſtico, ſeu gravis & fluctuoſus.

289 G. XV. HYDROMETRA.

Hypogaſtrii in mulieribus ſucceſſive creſcens tumor, uteri figuram referens, preſſioni cedens, fluctuanſve, ab iſchuria & graviditate diverſus.

290 G. XVI. PHYSOMETRA.

Conſtans, permanenſque tumor levis, elaſticus, uteri figuram, & ſedem referens in mulierum hypogaſtrio.

291 G. XVII. TYMPANITES.

Hydrops totius abdominis a flatu, ſeu elaſticus & levis.

G. XVIII. METEORISMUS. 292

Inflatio flatulenta, vel epigaſtrii, vel in morbo acuto ipſius abdominis.

G. XIX. ISCHURIA. 291

Tumor hypogaſtrii ex urinæ retentione ſæpius intra veſicam.

Species ſunt.

Iſchuriæ renales.

Iſchuria (*Nephritica*) a renum inflammatione, S. ſp. 1. *Schacht*. Inſtitut. med. pract. lib. VIII. cap. I. & VIII. *Gort*. Syſt. prax. med. de iſchur. *Fabric. Hildan*. de lithot. cap. IV. *Leal. a Fonte*, Conſ. 59. *Bonet*. Sepulchr. lib. III. ſect. XXIV. obſ. IV. §. 3. *Schenck*. lib. III. de iſchur. falſ. cap. IV. & V. *Etmuller* Coll. pract. pag. 994.
Iſchuria (*Nephrolithica*) a renum calculo, S. ſp. 2. *Schacht*. lib. citat. cap. II. & VIII. *Gort*. lib. citat. de morb. renum. *Car. Piſon*. de morb. a colluv. ſeroſ. *Schenck*. de iſchur. *Bonet*. Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. & Medic. ſeptentrional. de iſchur.
Iſchuria (*Nephroplethorica*) renalis a plethora, S. ſp. 3. *River*. Cent. I. obſ. 1. & 89. *Etmull. Schacht*. loco citat. *Gaub*. Pathol. de vit. mict. *Ludvvig*. Inſtit. med. clin. *Seb. Naſii* Specul. method. med. pag. 167.
Iſchuria (*Lunatica*) renalis lunatica, S. ſp. 4. *Tulp*. Obſ. med. lib. II. cap. 49.
Iſchuria (*Nephroſpaſtica*) renalis ſpaſmodica. S. ſp. 5. *Schacht*. *Gort*. lib. citat. *Sydenh*. Diſſer. epiſt. tom. 1. *Raulin* des malad. vapor. Mém. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1715.
Iſchuria (*Nephrelmintica*) renalis verminoſa, S. ſp. 6. *Gort*. lib. citat. *Gaub*. Pathol. de vit. mict.
Iſchuria (*Neprothromboides*) renalis a ſanguine congrumato, S. ſp. 7. *Mercat*. de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull*. de laeſ. urin. ſecret. pag. 314. *Fernel*. Pathol. lib. VI. c. 13. *Gort*. *Gaub*. loc. cit.
Iſchuria (*Nephropyica*) a renum purulentia. S. ſp. 8. *Schenck*. lib. III. de ren. tumorib. *Gort*. *Gaub*. loc. citat. *Bonet*. Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. *Sal. Diverſ*. de affect. particularib. cap. 14.

Iſchuria (*Nephrophlegmatica*) renalis pituitoſa ſeu mucoſa, S. ſp. 9. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Graſii* Ephem. natur. cur. an. III. obſ. 212. *Schacht. Gort. Gaub. Mercat.* loc. citat. *Varand.* de ren. affect. *Bonet.* Sepulchr. de iſchur. obſ. IV. V.

Iſchuria (*Nephroplegica*) renalis paralytodea, S. ſp. 10. *Sal. Diverſ. Mercat.* loc. citat. *Horſt.* tom. II. lib. IV. obſ. 49. *Marcel. Donat.* Hiſtor. med. mirab. lib. IV. cap. 28. *Barthol.* Cent. IV. epiſt. 18. 38. 39. *Hoechſtet.* Obſ. Dec. V. caſ. 20. *Claud.* Chaptal. pract. Monſpel.

Iſchuria (*Suppleta*) renalis ab alia evacuatione ſuppleta, S. ſp. 11.

a. A diarrhœa & ſudore, *Marcel. Donat.* Hiſt. med. mirab. lib. IV. c. 27. *Schenck.* lib. III. de diabete, obſ. 9.

b. Ab otorrhagia, *Sennert.* ex plat. pract. lib. III. part. VIII. Sect. II. cap. 9.

c. A perſpiratione, *Vandermond.* Journ. de med. tom. IV.

d. A ſudore, *Vandermond.* Journ. de med. tom. X.

2. Iſchuriæ uretericæ.

Iſchuria (*Ureteritica*) ureteritica inflammatoria, S. ſp. 12. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Ludvvig.* Inſtit. clin. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Schacht.* Inſtit. pract. de iſchur. ſpur.

Iſchuria (*Ureterolithica*). Iſchuria ureterica calculoſa, S. ſp. 13. *Tulp.* Obſ. med. lib. II. cap. 45. *Monro* Eſſais d' Edinb. tom. VI. art. 68. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. de urin. ſuppreſſ. *Schenck.* lib. III. de ureterib. *Sal. Diverſ.* loc. citat.

Iſchuria (*Uretero-thromboides*) Iſchuria ureterica, a ſanguinis grumo, S. ſp. 14. *Sal. Diverſ. Schacht. Gaub.* loc. cit. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. obſ. I.

Iſchuria (*Uretero-phlegmatica*) ureterica a pituita, S. ſp. 15. *Gort.* Prax. med. ſyſt. *Schacht. Sal. Diverſ.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. *Sebaſt. Naſ.* Spec. meth. med. loc. citat. *Epiphan. Ferdinand.* hiſt. 97.

Iſchuria (*Ureteropyica*) ureterica purulenta, S. ſp. 16. *Gort.* lib. cit. de ureter. morb. *Schacht. Sal.* loc. cit.

Iſchuria (*Ureteroſtomatica*) ab orificii ureterum inte-

ferioris clauſura, *Theod. Eller.* Miſcell. Berolin. Tom. IV. pag. 381. *Verdier* ex noel. Mém. de l'Acad. de chirurg. tom. II. obſ. 17. *Lieutaud.* Mém. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1753. *Franc. Syl. Deleboe* Prax. med. lib. II. *Saltzmann.* Obſ. anat. pag. 62.

3. Iſchuriæ veſicales.

Iſchuria (*Cyſtitica*) a veſicæ inflammatione, S. ſp. 18. *Schacht.* Inſtit. practic. Mém. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1704. 1753. *Boneti* Sepulchr. lib. III. de urin. ſuppreſſ. *Foreſt.* lib. XXV. obſerv. 27. 28. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno*, Hiſt. med. princ. lib. II. Hiſt. 150.

Iſchuria (*Cyſtolithica*) a veſicæ calculo, S. ſp. 19. *Tulpii* Obſerv. med. lib. IV. cap. 37. Eſſais d'Edinburg, tom. IV. *Foreſti* lib. XXV. obſ. 23. *Fabric. Hildani*, Cent. III. obſerv. 67. *Car. Piſonis* de morb. a colluv. ſeroſ. *Boneti* Sepulchret. de urin. ſuppreſſ. obſerv. X. &c.

Iſchuria (*Cyſtoſpaſtica*) a ſphincteris veſicæ ſpaſmo, S. ſp. 20. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. *Sebaſ. Naſii* Specul. method. med. part. II. pag. 267. *Nenteri* de iſchur. *Schachtii*, *Gorterii*, *Gaubii*, *Varendæi*, loc. citat.

Iſchuria (*Cyſtoplegica*) a veſicæ paralyſi, S. ſp. 21, *Lieutaud.* Compend. medic. de iſchur. *Zacut. Luſitan.* ex *Galeno* Hiſt. princ. hiſt. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom. IV. *Serane* Theſ. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat. Luſitan.* Cent. IV. cur. 10. *Pringle* Eſſais d'Edinburg. tom. I. artic. 23.

Iſchuria (*Polyurica*) a veſica lotio diutius cohibito diſtenta, S. ſp. 22. *Halleri* Prælect. in *Boerhaave*, tom. II. §. 384. pag. 336. *Foreſt.* lib. XXV. obſerv. 14. *Nenter.* de iſchuria. *Paræi* lib. XVI. cap. 48. *Sennert.* Pract. lib. III. part. VIII. ſect. 1. cap. 4. *Etmulleri*, *Riverii*, *Varandæi* de iſchur. &c.

Iſchuria (*Cyſtopyica*) veſicalis purulenta *Felic. Plateri Mantiſ.* Obſ. 29. *Camerar.* Ephem. natur. curioſ. tom. II. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno*, Hiſt. medic. princip. hiſt. 148. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Sebaſt. Naſii* Specul. method. med. part. II. pag. 167. *Andre* des maladies de l'urethre, obſerv. 16. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX.

Iſchuria (*Cyſtothromboides*) veſicalis a ſanguinis gru-

gruſno; S. ſp. 24. *Claudini* conſult. 141. *Fabric. Hildani* Cent. III. obſerv. 66. *Foreſti* lib. XXV. obſ. 20. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno* Hiſt. med. princip. hiſt. 145. & ejuſdem Prax. med. admirab. lib. II. cap. 65. *Mercati* de morb. intern. cur. cap. 12.

Iſchuria (*Cyſtophlegmatica*) veſicalis a muco, S. ſp. 25. *Mercati* loc. citat. *Schacht.* Inſtit. medic. pract. lib. VIII. cap. 9. *Etmulleri* de iſchur. veſical. *Amati Luſitani*. Cent. VI. cur. 12. *Zacuti Luſitani*, Prax. med. admirab. lib. II. obſerv. 64. *Boneti* ex *Thom. Bartholin.* de urin. ſuppreſſ. obſerv. 17.

Iſchuria (*Ectopocyſtica*) a veſicæ ectopia, S. ſp. 16.
a. Herniosa, ſeu a cyſtocele. *Verdier* Mém. de l' Acad. de Chirurg. tom. II. obſerv. 4. 6. 9. 10. 14. *Felic. Plater.* obſerv. pag. 830.
b. Proptoica, ſeu ab exocyſte, *Verdier* ex Noel. lib. citat. obſ. 17.

Iſchuria (*Cyſtoproctica*) veſicalis, ab inteſtino recto, ſcybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abſceſſu, hæmorrhoidibus turgente. *Dodonæi* Obſerv. medic. cap. 47. *Schenck.* lib. III. de iſchur. obſerv. 6. *VVepferi* Diſſert. de apopl. pag. 391. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX. pag. 261. *Boneti* Sepulchret. de urin. ſuppreſſ. obſerv. 18. §. 4. *Schacht. Gaubii*. loc. citat.

Iſchuria (*Hyſterocyſtica*) veſicalis ab utero, S. ſp. 28.
a. Gravido, *Nordman.* Diſſert. de iſchur. gravidar. *Mauriceau*, lib. I. c. XV. *Roderici a Caſtro*, lib. II. cap. XV.
b. Parturiente, *Boneti* ex *Riolani* de urin. ſuppreſſ. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V.
c. Hydropico, *Hippocrat.* de morb. mulier. lib. 12. *Sennerti* Pract. lib. IV. part. I. ſect. II. c. X. XI. *Schenck.* lib. IV. de mol. falſ. *Schacht. Gaubii*, l. cit.
d. Tumoribus diſtento, *Gaubii*, *Schachtii*, loc. cit. *Sennerti* ibidem, ac ſupra, cap. XIII. *Knoeffelii*; E. N. C. ann. IV.
e. Prociduo, *Nordmann.* Diſſert. citata. *Sabatier* Mém. de l' Acad. de Chirurg. tom. III. *Sennerti* ibid. ac ſupra cap. XVI.

Iſchuria (*Atretarum*) urethrocyſtica a menſtruis in vagina retentis, S. ſp. 29. *Amyand* Tranſact. philoſ. ann. 1732. No. 442. art. 3. pag. 45. *Schenck.* lib. IV. de part. genit. mulier. obſerv. 9. *Heiſter.* Chirurg.

rurg. tom. II. pag. 951. *Aſtruc.* de morb. mulier. tom. I. lib. 1. cap. 5.

Iſchuria paradoxa, S. ſp. 30. *Morgagni* Epiſt. *Le Clerc.* Journ. de med. Juill. 1755. p. 11.

4. Iſchuriæ urethrales.

Iſchuria (*Perinæalis*) urethralis a perinæi tumore, S. ſp. 31. *Galen.* lib. de affect. loc. & ex eo *Zacuti Luſitan.* Hiſt. 149. *Vandermond* ex *Daran.* Journ. de med. tom V. pag. 291. *Tulp.* Obſerv. med. lib. III. cap. X. *Foreſt.* lib. XXVI. obſ. 2.

Iſchuria (*Urethrolithica*) a calculo urethræ impacto, S. ſp. 32. *Schmid.* Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obſ. 89. *VVinckler.* ibid. tom. VI. obſerv. 34. *Zacut. Luſitan.* Prax. med. admirab. lib. II. obſ. 66. 67. 68. *Tulp.* Obſerv. med. lib. III. cap. VIII. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. obſerv. 14. *Barthol.* cent. IV. epiſt. 5. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 839.

Iſchuria (*Urethrophlegmatica*) a muco urethram infarciente, S. ſp. 33. *Bonet.* Sepulchr. & medic. ſeptent. *Manget.* Biblioth. med. pract. *Amat. Luſitan.* cent. V. obſ. 71. *Foreſt.* libr. XXV. obſ. 25. *Varand.* de iſchur. *Lud. Apin.* Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. obſ. 69.

Iſchuria (*Urethrothromboides*) a ſanguinis grumo urethram opplente, S. ſp. 34. *Bonet.* Med. ſeptentrion. de iſchur. & ſepulchr. de urin. ſuppreſ. obſ. XI. *Foreſt.* lib. 25. obſ. 25.

Iſchuria (*Urethropyica*) a pure urethram obſtruente, S. ſp. 35. *Bonet.* Med. ſeptentr. de iſchur. *Foreſt.* Scholio modo citat. *Boerhaave* Præfat.

Iſchuria (*Urethrohymenodes*) a membrana in urethram impacta, S. ſp. 36. Hiſt. de l' Acad. R. des ſc. ann. 1714. hiſt. pag. 22.

Iſchuria (*Urethrelmintica*) urethralis verminoſa, S. ſp. 37. *Joan. Petr. Albreicht.* Vid. *Bonet.* Medicinam ſeptentrionalem de urin. cap. 31. & *Manget.* Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. ſpectant. *Vandermonde* Journ. de med. Septembre 1758. pag. 245. *Joan. Rhodii* Centur. 3. obſ. 36. Collect. Acad. tom. 3. pag. 497. obſ. 77.

Iſchuria (*Urethritica*) ab urethræ inflammatione, S. ſp. 38. *Hildan.* Cent. IV. obſ. 54. *Foreſt.* de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. verſus finem. *Varand.* de affectib. ren. & veſic. cap. VII. *Bonet.* Medic. ſeptentr. de iſchuria, cap. 1. No. V.

Gou-

Goulard. de malad. de l'urethre. *Heiſter.* Chirurg. tom. 2. pag. 838.

Iſchuria (*Carunculoſa*) a morbis, ut vocant, urethræ, S. ſp. 39. *Amat. Luſitan.* cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. *Sharp.* Recherches crit. c. IV. *Goulard.* des malad. de l' urethre. *Heiſter.* Chirurg. t. II. pag. 834. *Andre* des maladies de l' urethre, paſſim.

Iſchuria (*Hydrocelodes*) ab urethræ ruptura in ſcrotum hiante, S. ſp. 40. *Joan. Lud. Apin.* Miſcell. nat. cur. decad. III. ann. III. obſ. 68.

Iſchuria (*Cryptopyica*) a penis intra corpus retractione, S. ſp. 41. *Fred. Hoffm.* Conſult. de morb. abdom. caſ. 105.

Iſchuria (*Perideſmica*) a vinculo ſtrictiori peni injecto, S. ſp. 42. *Bonet.* med. ſeptentr. de Iſchuria, cap. 1. No. VIII.

Iſchuria (*Phimoſica*) urethralis a phimoſi, S. ſp. 43. *Horſt.* tom. II. lib. IV. pag. 274.; *Goulard.* de malad. de l' urethre, *Heiſt.* Chirurg. tom. II. pag. 818. *Bonet.* Sepulchr. de iſchur. obſ. XV.

Iſchuria (*Aſpadialis*) ab urethræ clauſura, S. ſp. 44. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 818. & 951. *Horſt.* tom. II. obſ. 55. *Joan. VVieri* obſ. pag. 221.; *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſ. obſerv. XV. ſchol. & med. ſeptentr. de iſchur. cap. 2. §. VI.

O. IV. TUBERA.

Tumores partium ſolidarum, non hydropici.

294 G. XX. RACHITIS.

Deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis mole, cum ingenio præcoci, in puerulis.

295 G. XXI. SCROPULA, *J Allen.* Synopſis.

Tumor ſcirrhoſus glandularum colli, menſen teriique, cum labiis & naſo craſſioribus.

296 G. XXII. CARCINOMA.

Ulcera cancroſa cum doloribus lancinantibus.

G. XXIII. LEONTIASIS. 297

Papillæ ſetaceæ vel corniculatæ cutim exaſperantes.

G. XXIV. MALIS, 298

Tumores ſæpius purulenti, vel ulcera, cum inſectis vermiforibus, paſſim enata.

G. XXV. FRAMBÆSIA. 299

Excreſcentiæ fungoſæ, mori inſtar granuloſæ ſæpius cum ulceribus, &c.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi chronici ſæpius contagioſi qui cutis excreſcentias, tumores gregales, exulcerationes, cruſtas, &c. inducunt.

XXVI. SYPHILIS. 300

Poſt impurum concubitum ulcuſcula, porri, bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, prægreſſa non raro gonorrhœa, dein puſtulæ cruſtoſæ, dolores nocturni, caries &c. in cæteris partibus.

G. XXVII. SCORBUTUS. 301

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpuroviolaceis potiſſimum tibiarum.

G. XXVIII. ELEPHANTIASIS. 302

Facies deformis tuberibus calloſis, ozæna, raucedo, cutis elephantina craſſa unctuoſa, in extremis artubus anæſtheſia.

G. XXIX LEPRA. 303

Tubercula calloſa, ſcabie majora, vel cruſtis & ſquamis diffuſa, herpetica, per cutem diſperſa, pruriginoſa.

G. XXX. SCABIES. 304

Puſtulæ cruſtoſæ, lentis magnitudine, pruriginoſæ, manus potiſſimum obſidentes.

G. XXXI.

305 G. XXXI. TINEA.

Cruſtæ flavæ vel griſeæ, ulceroſæ, per caput diſperſæ.

O. VI. ICTERITIÆ.

Totius cutis color inaſſuetus ſine pyrexia acuta

306 G. XXXII. AURIGO.

Oculorum & cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

307 G. XXXIII. MELASICTERUS.

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro atrofuliginoſus.

308 G. XXXIV. PHOENIGMUS.

Rubor diffuſus, vel maculoſus ſine pyrexia.

309 G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui falſo nomen Hippocrati tribuit.

Pallor; vel fuſcus color cutis, oculis minime flavis; ſæpius cum pica.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa claſſeos & affinitas cum prioribus ordinibus,

310 G. XXXVI. PHTHIRIASIS.

Exortus pediculorum vel inſectorum pediculis affinium ex diverſis corporis partibus, quas porrigine, ulcuſculiſque defœdant, aut puncturis, pruritu diſcruciant.

311 G. XXXVII. TRICHOMA, *Jachii*.

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, ſæpius cum phthiriaſi.

312 G. XXXVIII. ALOPECIA.

Capillorum lapſus cum cuticulæ deſquamatione.

G. XXXIX. ELCOSIS. 313

Numeroſa vel ampla ulcera chronica, carioſa, fœtida cum pyrexia lenta.

G. XL. GANGRÆNA. 314

Initio mors partis, dein ejus putrida diſſolutio.

G. XLI. NECROSIS. 315

Partis mors, ſine tumore prævio, deinde vero exſiccatio, induratio, nigredo.

PARS SECUNDA.

GENERA
MORBORUM
DEFINITA

AB ILLUSTRI

CAROLO A. LINE,

EQUITE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Uſpaliæ 1763.

CLAVIS CLASSIUM.

MORBI.

Febriles (e ſanguine in medullam.)		
	EXANTHEMATICI	I
	CRITICI	II
	PHLOGISTICI	
Temperati		
Nervini		
Senſationis	DOLOROSI	IV
Judicii	MENTALES	V
Motus		
	QUIETALES	VI
	MOTORII	VII
Fluidi Secretionis		
	SUPPRESSORII	VIII
	EVACUATORII	IX
Solidi.		
Interni	DEFORMES	X
Externi	VITIA	XI

EXANTHEMATICI Febris cum efflorescentia cutis maculata.

CRITICI Febris cum Urinæ hypoſtaſi lateritia.

PHLOGISTICI Febris cum Pulſu duro, Dolore topico.

DOLOROSI Doloris ſenſatio.

MENTALES Judicii alienatio.

QUIETALES Motus abolitio.

MOTORII Motus involuntarius.

SUPPRESSORII Meatuum impeditio.

EVACUATORII Fluidorum evacuatio.

DEFORMES Solidorum facies mutata.

VITIA Externa palpabilia.

SYMPTOMATA ſe habent ad Morbum, ut Folia & Fulcra ad Plantam.

FEBRIS dignoſcitur Pulſu citato.

I. EXANTHEMATICI.

I. CONTAGIOSI.

I. MORTA.

Phlyctænæ (273) aliquot in Abdomine ſive Artubus, magnitudine avellanæ.

Febris Diaria (11) maligniſſima; funeſtiſſima.

II. PESTIS.

Anthraces (272) ſeu *Bubones* (271) gangrænoſi (233). *Febris* Synocha (12) acutiſſima, funeſtiſſima. Vertigo (74), Anxietas (89), Lipyria.

III. VARIOLA.

Puſtulæ (274) eryſipelaceæ, ſuppurantes, eſcharoticæ (280), deciduæ, cicatriſantes (317).

Febris Synochus (13), Cephalalgia (40), Lumbago (62).

IV. RUBEOLA.

Papulæ (275) uniformes, rubræ, evaneſcenti-furfuraceæ.

Febris Synocha (12), Sternutatio (154), Epiphora (v72), Tuſſis (155) ſicca.

V. PETECHIA

Sudamina (321) livido lurida, ſuperficialia, inſenſibilia,

Febris exacerbans (23), Aſthenia (92), Agrypnia (130).

No-

VI. SIPHYLIS.

Nodi (262), *ulcuſcula*, *Myrmeciæ* (179.)
Febris Lenta (14) nocturna, dolore oſtocopo (61), Marcore (209), Stranguria (169), Angina (46).

II. SPORADICI.

VII MILIARIA.

Papulæ (275) rotundæ, immerſæ, diverſicolores, confertæ, intacta facie, pruriginoſæ.
Febris Synocha (12), Sudore (267) fœtido, punctorio.

VIII. UREDO.

Sudamina (321) inæqualia, ruberrima, dilabilia, pruriginoſa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-evaneſcentia.
Febris Hectica (24) benigna brevis.

IX. APHTA.

Eſcharæ (280) albidæ, rotundæ, ductibus excretoriis internis innatæ.
Febris Lenta (14) obſcura, cum Somnolentia (96)

III. SOLITARII.

X. ERYSIPELAS

Macula rubens, urens, preſſione diſſimulanda, tumidiuſcula, ſuperficialis, dilatabilis, deſquamatione finienda.
Febris Synocha (12) initio acuta, cum inquietudine.

Protypus Exanthematicorum *Eryſipelas* (10) eſt.
Dyſenteria (191) ad Contagioſos referreretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.
Malignitatis ſymptoma imprimis ſunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (107), *Atnæſtheſia* (118), *Lypiria*, *Carpologia* (135), *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

II. CRITICI.

I. CONTINENTES.

XI. DIARIA.
Febris terminanda intra ſeptimanam dimidiam.

XII. SYNOCHA.
Febris terminanda intra ſeptimanam unicam.

XIII. SYNOCHUS.
Febris terminanda intra ſeptimanas duas vel tres.

XIV. LENTA.
Febris protrahenda ultra ſeptimanas tres.

II. INTERMITTENTES.

XV. QUOTIDIANA.
Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris ſingulis.

XVI. TERTIANA.
Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris alternis.

XVII. QUARTANA.
Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris tertiis.

XVIII. DUPLICANA.
Febris paroxyſmi ſimiles alternati.

XIX. ERRANA.
Febris paroxyſmi diſſimiles omnes.

II. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.
Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.
Febris continens (14) cum Tertiana (16).

XXII. TETARTOPHIA.
Febris continens (14) cum Quartana (17).

XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritæus (21) cum Amphemerina (20).

XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

Protypus Criticorum Tertiana (16) *ſit*, *aut potius* Rheumatiſmus (62).

Apyria *eſt deflagratio febris*.

Phthiſis (208) *poſſet poſt Hecticam* (24) *collocari*, *ſi ordo naturalis admitteret & expectoratio*.

Lethargus (98) *cum Febricula his affinis eſt*.

III. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

XXV. PHRENITIS.

Inflammatio (231) *Meningum*.

Febris Synocha (12), Cephalalgia (40), Furor (68), Anxietas (89), Syringmos (72), Opthalmia (43); Carpologia (135), Oblivio (107).

XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatio (231) *Diaphragmatis*.

Febr. Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

XXVII. PLEURITIS.

Inflammatio (231) *Pleuræ*.

Febr. Synocha (12), Dyſpnœa (160), Tuſſis (155); Hæmoptyſis (179), Pleuritica (53).

XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatio (231) *Ventriculi*.

Febr. Amphemerina (20), Lipyria, Anxietas (89). Vomitus (183) ingeſtorum, Cardialgia (48).

XXIX. ENTERITIS.

Inflammatio (231) *Inteſtini*.

Febr. cum evacuatione abdominis, colica (50) atroci, tenſiva, calente.

XXX. PROCTITIS.

Inflammatio (231) *Ani*.
Febr. Proctica (59) cum Teneſmo (193).

XXXI. CYSTITIS.

Inflammatio (231) *Veſicæ*.
Febr. Dolor Hypogaſtrii cum tumore inflammatorio, Dyſuria (57), Teneſmo (193).

II. PARENCHYMATICI.

XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) *Encephali*.
Febr. Synochus (13), Delirium (65), Carpologia (135). Aſthenia (92), Immobilitas, Anæſtheſia (118), Aphonia (115).

XXXIII. CYNANCHE.

Inflammatio (231) *Faucis*.
Febr. Synocha (12), Tuſſis (155), Aglutitio (164), Orthopnœa (162, Angina (46), Suffocatio (158), Linguæ intumeſcentia.

XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatio (231) *Pulmonis*.
Febr. Synocha (13), Tuſſis (155), Hæmoptyſis (179) Dyſpnœa (160), Interſcapulii dolor, Cubatus ſupinus.

XXXV. HEPATITIS.

Inflammatio (231) *Jecinoris*.
Febr. Amphemerina (20), Tuſſis (155) ſicca, Aſthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tenſio calens.

XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatio (231) *Lienis*.
Febr. Tetartophia (22), Reſpiratio interſecta (149), Hypochondrii ſiniſtri tumor pulſatorius.

XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatio (231) *Renis*.
Febr. Synochus (13) irregularis, Nauſea (182), Singul-

gultus (153), Ructus (181), Urinæ varietas, Obſtipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris ſtupor (105).

XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatio (231) *Uteri*.
Febr. Delirium (65), Spaſmus (121), Sardiaſis (125), Dolor hypogaſtrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatio (231) *Partis Externæ*.
Febris ex partis externæ tumore pulſatorio, Rubore tenſivo, calente.

Lipyria *dum externa frigent, interna fervent.*
Protypus Phlogiſticorum Phlegmone (39) eſt.
Delirium (65) *quaſi primus gradus Phrenitidis eſt.*

IV. DOLOROSI.

I. INTRINSECI.

XL. CEPHALALGIA.

Capitis totius aut portionis dolor gravativus.

XLI. HEMICRANIA.

Capitis lateralis dolor tenſivus.

XLII. GRAVEDO.

Fronis dolor preſſorius.

XLIII. OPHTHALMIA.

Oculi dolor.

XLIV. OTALGIA.

Auris dolor.

XLV. ODONTALGIA.

Dentis dolor maxillaris.

XLVI. ANGINA.

Faucis dolor cum ſuffocatione (158).

XLVII. SODA.

Oeſophagi dolor rancido deurens Ructibus (181) calidis.

XLVIII. CARDIALGIA.

Cardiæ dolor ſcrobiculi ſubſyncopalis (94).

XLIX. GASTRICA.

Ventriculi dolor epigaſtrii.

L. COLICA.

Inteſtini dolor umbilicalis cum torminibus (123).

LI. HEPATICA.

Jecinoris dolor hypochondrii dextri.

LII. SPLENICA.

Lienis dolor hypochondrii ſiniſtri, ſuſpiria (150).

LIII. PLEURITICA.

Thoracis dolor lateralis punctorius.

LIV. PNEUMONICA.

Pulmonis dolor cum Orthopnœa (162), Tuſſi (155), Hæmoptyſi (179)

LV. HYSTERALGIA.

Uteri dolor.

LVI. NEPHRITICA.

Renis dolor.

LVII. DYSURIA.

Veſicæ dolor.

LVIII. PUDENDAGRA.

Genitalis dolor.

LIX. PROCTICA.

Ani dolor.

II. EXTRINSECI.

LX. ARTHRITIS.

Geniculorum dolor periodicus;
a Synovia corrupta.

LXI. OSTOCOPUS.

Articulorum dolor internus fixus;
a Perioſtio infecto.

LXII. RHEUMATISMUS.

Muſculorum dolor ad motum;
a Tunica celluloſa infecta.

LXIII. VOLATICA.

Vaſorum dolor migrans.

LXIV. PRURITUS.

Cutis titillatio occulta, *Scalpendi neceſſitatem inducens*

Raphania (245) *dolore intenſo his affinis; Ob Spaſmos vero & Convulſiones ſequentibus.*

V. MENTALES.

I. IDEALES.

LXV. DELIRIUM.

Inſania acuta, tranſitoria, ſymptomatica cum febre.

LXXI. PARAPHROSYNE.

Inſania acuta, periodica, ſine febre.

LXVII. AMENTIA.

Inſania chronica, univerſalis, innocua.

LXVIII. MANIA,

Inſania chronica, univerſalis, furibunda.

LXIX. DÆMONIA.

Inſania chronica, partialis, furibunda, meticuloſa, de Dæmonibus.

LXX.

LXX. VESANIA.

Inſania chronica, partialis, tranquilla.

LXXI. MELANCHOLIA.

Inſania chronica, partialis, mœſta, meditabunda.

II. IMAGINARII.

LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni* tinnitantis falſi.

LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Viſibilis* objecti falſi.

LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falſæ.

LXXV. PANOPHOBIA.

Imaginatio *mali* falſi in ſolitudine.

LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Borborygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Præcordia tremula, Perſuaſio.

LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *ſomniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur.

III. PATHETICI.

LXXVIII. CITTA.

Deſiderium *non Eſculenti* ingerendi.

LXXIX. BULIMIA.

Deſiderium *Cibi* inexplebile.

LXXX. POLYDIPSIA.

Deſiderium *Potus* continuum.

LXXXI. SATYRIASIS.

Deſiderium *Veneris* enorme.

LXXXII. EROTOMANIA.

Deſiderium *Amantium* pudicum.

LXXXIII. NOSTALGIA.

Deſiderium *Patriæ* Affiniumve.

LXXXIV. TARANTISMUS.

Deſiderium *Choreæ* (*ſæpe a morſura Inſecti*).

LXXXV. RABIES.

Deſiderium *Mordendi* lacerandique innocuos (*ſæpe a Morſura Mammalis.*)

LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Averſatio *Potulentorum* cum Rigore (141) & Sardiaſi (125); (*ſæpius præcedenti maritata*).

LXXXVII. CACOSITIA.

Averſatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Averſatio *obiecti* particularis.

LXXXIX. ANXIETAS.

Averſatio *mundanarum* rerum.
(*Cordis dolor*).

V. QUIETALES.

I. DEFECTIVI.

XC. LANGUOR.

Debilitas conſtans muſculorum ponderoſa, quietem inducens.

XCI. LANGUOR.

Debilitas ſucceſſiva virium vitalium, non reparanda quiete & cibatione.

XCII. ASTHENIA.

Debilitas ſucceſſiva virium omnium.

XCIII.

XCIII. LIPOTHYMIA.

Defectio motus ſenſuſque ſubita, ſuperſtite Pulſu Menteque.

XCIV. SYNCOPE.

Lapſus virium vitalium ſubitaneus; abolitis Pulſu, Reſpiratione, Senſu, Calore.

XCV. ASPHIXIA.

Lapſus virium animalium vitaliumque perſiſtens.

II. SOPOROSI.

XCVI. SOMNOLENTIA.

Sopor vigiliis protractior.

XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia conſtans, levis, febrilis, Delirio (65) oblivioſo.

XCIX. CATAPHORA.

Sopor conſtans allocutione evigilans.

C. CARUS.

Sopor conſtans cum inſenſibilitate, reſpirationeque tacita.

CI. APOPLEXIA.

Sopor conſtans cum inſenſibilitate, reſpirationeque ſtertoroſa (156).

CII. PARAPLEGIA.

Sopor conſtans partium ſub thorace.

CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor conſtans lateris alterius.

CIV. PARALYSIS.

Sopor conſtans partis alicujus.

CV. STUPOR.

Sopor tranſitorius partis alicujus cum ſenſu formicationis.

III. PRIVATIVI.

CVI. MOROSIS.

Imaginationis defectus.

CVII. OBLIVIO.

Memoriæ defectus.

CVIII. AMBLYOPIA.

Viſus obſcuritas ſine vitio ſenſibili.

CIX. CATARACTA.

Viſus privatio cum vitio obſervabili.

CX. AMAUROSIS.

Viſus privatio ſine vitio ſenſibili, pupilla dilatata.

CXI. SCOTOMIA.

Viſus Lypothymia (93) momentanea.

CXII. COPHOSIS.

Auditus defectus.

CXIII. ANOSMIA.

Olfactus defectus.

CXIV. AGEUSTIA.

Guſtus defectus.

CXV. APHONIA.

Loquelæ privatio.

CXVI. ANOREXIA.

Famis defectus.

CXVII. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CXVIII. ANÆSTHESIA.

Tactus ſenſationis defectus.

CXIX.

CXIX. ATECNIA.

Libidinis defectus.

CXX. ATONIA.

Fibrarum Muſcularium contractionis defectus.

VII. MOTORII.

I. SPASTICI.

CXXI. SPASMUS.

Artus diſtenſio violenta, ſubitanea; fugax.

CXXII. PRIAPISMUS.

Penis ſpaſtica intumeſcentia.

CXXIII. BORBORYGMUS.

Inteſtinorum contractio boans.

CXXIV. TRISMOS.

Mandibularum clauſura arcta.

CXXV. SARDIASIS.

Oris retractio riſum mentiens, fugax.

CXXVI. HYSTERIA.

Præcordiorum preſſio ſub pectore, cum flatulentia (165), Suffocatione (158), Anxietate (89), Palpitatione (132), verticis preſſione.

CXXVII. TETANUS.

Corporis rigiditas cum ſenſibilitate.

CXXIII. CATOCHUS.

Corporis rigiditas cum inſenſibilitate.

CXXIX. CATALEPSIS.

Corporis totius recepta forma, conſtans, flexilis, cum inſenſibilitate.

CXXX.

CXXX. AGRYPNIA.

Senſorii rigiditas ſpaſtica, continua *Pervigilium*).

II. AGITATORII.

CXXXI. TREMOR.

Partium agitatio continua, chronica, abſque frigoris ſenſu.

CXXXII. PALPITATIO.

Cordis Viſceriſve motus ſubſultorius.

CXXXIII. ORGASMUS.

Arteriarum ſubſultus.

CXXXIV. SUBSULTUS.

Tendinum ſubſultoria elevatio.

CXXXV. CARPOLOGIA.

Digitorum tremula contractio inſcia.

CXXXVI. STRIDOR

Manducatio ſonora, vacua.

CXXXVII. HIPPOS.

Palpebrarum nictitatio frequentiſſima.

CXXXVIII. PSELLISMUS.

Loquelæ titubatio in quibuſdam literis.

CXXXIX. CHOREA.

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

CXL. BERIBERI.

Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (246).

CXLI. RIGOR.

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei ſenſu.

CXLII. CONVULSIO.

Partium agitatio violenta, periodica, cum ſenſibilitate.

CXLIII.

CXLIII. EPILEPSIA.

Corporis agitatio periodica, chronica, cum inſenſibilitate.

CXLIV. HIERANOSOS.

Corporis agitatio continua, indolens, convulſiva, cum ſenſibilitate.

CXLV. RAPHANIA.

Articulorum contractio ſpaſtica, cum Agitatione convulſiva, Dolore violentiſſimo, periodico.

VIII. SUPPRESSORII.

I. SUFFOCATORII.

CXLVI. RAUCEDO.

Vocis ſibilans elocutio ab areſcentia pneumatica.

CXLVII. VOCIFERATIO.

Vocis doloroſa exaltataque exclamatio.
Ad Corpus indurandum.

CXLVIII. RISUS.

Expiratio profunda, agitatoria, cum Sardiaſi (125).
Ad Sanguinem e Corde expellendum.

CXLIX. FLETUS.

Inſpiratio interſecta, ſingultuoſa, cita, ſuſpiroſa, cum mœſtitia, gemitu, lacrymis (172).
Ad ſanguinem intro pulmones inglutiendum.

CL. SUSPIRIUM.

Inſpiratio profunda, agitatoria, lenta.
Ad ſanguinem e pulmonibus expellendum.

CLI. OSCITATIO.

Inſpiratio tarda, adaucta, hians, ſpaſmodica.
Ad ſanguinem propellendum per pectus.

CLII. PANDICULATIO.

Inſpiratio profunda, preſſoria cum extenſione corporis artuumque.

Ad

Ad ſanguinem per vaſorum anaſtomoſes propellendum.

CLIII. SINGULTUS.

Inſpiratio celer, convulſiva, momentanea, iterata, ſonora.

Ad Cardiam evacuandam.

CLIV. STERNUTATIO.

Expiratio ſonora, convulſiva, celer, inſpirationi lentæ ſuccedens.

Ad ſinum Frontis evacuandum.

CLV. TUSSIS.

Expiratio ſonora, convulſiva, periodica.

Ad Tracheam evacuandam.

CLVI. STERTOR.

Reſpiratio ſonora, rauca, narium agitatione.

Ad mucum faucium ſubigendum.

CLVII. ANHELATIO.

Reſpiratio citatiſſima, profunda, lævis, fugax.

Ad ſanguinem per pulmones accelerandum.

CLVIII. SUFFOCATIO.

Reſpiratio anguſtatione faucium continua, ſine febre.

A Tracheæ anguſtatione.

CLIX. EMPYEMA.

Reſpiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, poſt febrim.

A pure in cavum Thoracis effuſo.

CLX. DYSPNŒA.

Reſpiratio anheloſa (157), laborioſa, ſine ſenſu anguſtationis faucium.

A pulmonum ſubſtantia oppilata.

CLXI. ASTHMA.

Reſpiratio ſtertorosa (156), laborioſa, difficilis chronica.

A Bronchiis oppilatis.

CLXII. ORTHOPNŒA.

Reſpiratio ſuſpirioſa (150), ſuffocatoria (158), acuta, ſubitanea.

A ſanguinis per pulmones difficili tranſitu.

CLXIII. EPHIALTES.

Reſpiratio profunda, ſuffocans (158); dormientis in dorſo cum ſomno laborioſo.

Ab Inteſtinorum inflatione premente.

II. CONSTRICTORII.

CLXIV. AGLUTITIO.

Deglutitio impedita.

CLXV. FLATULENTIA.

Ructus (181) Crepituſque (194) impeditus, cum abdominis intumeſcentia.

CLXVI. OBSTIPATIO.

Fæcum exoneratio impedita.

CLXVII. ISCHURIA.

Mictus impeditus.

CLXVIII. DYSMENORRHŒA.

Menſtrua ſuppreſſa ſ. dolorifica.

CLXIX. DYSLOCHIA.

Lochiorum ſuppreſſio.

CLXX. AGLACTATIO.

Lactis defectus.

CLXXI. STERILITAS.

Genituræ ſuppreſſio.

IX. EVACUATORII.

I. CAPITIS.

CLXXII. OTORRHŒA.
Auris purulentus fluxus.

CLXXIII. EPIPHORA.
Oculi lacrymalis fluxus continuus.

CLXXIV. HÆMORRHAGIA.
Naris ſanguineus fluxus.

CLXXV. CORYZA.
Naris mucoſus fluxus, copioſus, continuus.

CLXXVI. STOMACACE.
Oris ſanguinea e gingivis cruentatio.

CLXXVII. PTYALISMUS.
Oris ſalivalis e glandulis copioſiſſimus effluxus,

II. THORACIS.

CLXXVIII. SCREATUS.
Faucis muci ſonora evacuatio.

CLXXIX. EXPECTORATIO.
Pulmonis ſeroſa e Trachea evacuatio.

CLXXX. HÆMOPTYSIS.
Pulmonis ſanguinea cum Tuſſi evacuatio.

CLXXXI. VOMICA.
Pulmonis purulenta, copioſa, improviſa evacuatio.

III. ABDOMINIS.

CLXXXII. RUCTUS.
Rejectio *Flatuum* frequens.

CLXXXIII. NAUSEA.

Rejectionis *Cibi Flatuumque* conatus inanis.

CLXXXIV. VOMITUS.

Rejectio ingeſtorum convulſiva.

CLXXXV. HÆMATEMESIS.

Vomitus (184) ſanguinis.

CLXXXVI. ILIACA.

Vomitus (184) cum Obſtipatione (166) fixa & Colica (50).

CLXXXVII. CHOLERA.

Vomitus (184) cum Diarrhœa (188), Colica (50.)

CLXXXVIII. DIARRHŒA.

Dejectio *Fæcum* liquidarum frequens.

CLXXXIX. LIENTERIA.

Diarrhœa (188.) Cibi immutati.

CXC. CŒLIACA.

Diarrhœa (188) Chymi.

CXCI CHOLIRICA.

Diarrhœa (188) rubella, abſque Colica.

CXCII. DYSENTERIA.

Diarrhœa (188) cruenta, cum Colica (50), Teneſmo (194.)

CXCIII. HÆMORRHOIS.

Dejectio *Sanguinis* cum Proctica (59), abſque Colica.

CXCIV. TENESMUS.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum deſiderio.

CXCV. CREPITUS.

Dejectio *Flatuum* copioſa, crebra.

IV.

IV. GENITALIUM.

CXCVI. ENURESIS.

Urinæ ſtillicidium involuntarium, indolens.

CXCVII. STRANGURIA.

Urinæ parca, guttata, frequens, doloroſa micturitio.

CXCVIII. DIABETES.

Urinæ copioſiſſimæ frequens micturitio.

CXCIX. HÆMATURIA.

Urinæ cruentæ micturitio.

CC. GLUS.

Urinæ viſcoſæ micturitio.

CCI. GONORRHŒA.

Geniture ſtillicidium.

CCII. LEUCORRHŒA.

Muci e ſinu muliebri effluxus.

CCIII. MENORRHAGIA.

Menſtruatio copioſa, inordinata.

CCIV. PARTURITIO.

Fœtus maturi enixus laborioſiſſimus.

CCV. ABORTUS.

Fœtus præmatura ejectio.

CCVI. MOLA.

Maſſæ carneæ, intus cyſticoſæ, ex utero ejectio.

V. CORPORIS EXTERNI.

CCVII. GALACTIA.

Lactis effluxus.

CCVIII. SUDOR.

Seri per poros copioſa, frequens ſudatio.

X. DEFORMES.

I. EMACIANTES.

CCIX PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tuſſi (155), Dyſpnœa (160), Expectoratione (178) purulenta, copioſa.

CCX. TABES.

Marcor cum Hectica (24), *abſque Expectoratione.*

CCXI. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), *abſque Expectoratione & Hectica.*

CCXII. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (226), *abſque Atonia, Expectoratione, Hectica.*

CCXIII. RACHITIS.

Marcor carnium tumentibus artuum Geniculis Capiteque; oſſibuſque ſæpe flexilibus.

II. TUMIDOSI.

CCIV. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinoſa intumeſcentia.

CCXV. LEUCOPHLEGMATIA.

Corporis emphyſematoſa (229) intumeſcentia.

CCXVI. ANASARCA.

Corporis œdematoſa (230) intumeſcentia.

CCXVII. HYDROCEPHALUS.

Capitis œdematoſa (230) intumeſcentia, hiantibus ſuturis cranii.

CCXVIII. ASCITES.

Abdominis œdematoſa (230) intumeſcentia.

CCXIX.

CCXIX. HYPOSARCA.

Abdominis nodoſa intumeſcentia.

CCXX. TYMPANITES.

Abdominis flatulenta (165) intumeſcentia, conſtans, ſonora.

CCXXI. GRAVIDITAS.

Abdominis a fœtu intumeſcentia nimia.

III. DECOLORES.

CCXXII. CACHEXIA.

Pallor corporis œdematoſus (230), cum debilitate, mœrore.

CCXXIII. CHLOROSIS.

Viridi-cinereus color faciei fœmineæ cum Citta (78).

CCXXIV. SCORBUTUS.

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Laſſitudine (90) matutina, Stomacace (175) Labario (309).

CCXXV. ICTERUS.

Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, fæcibus albidis, (*Obſtipatio Bilis*).

CCXXVI. PLETHORA.

Rubedo corporis a diſtentis vaſis ſanguineis, cum Dyſpnœa (160).

HYDROPIS nomine veniunt Anaſarca (216), *Aſcites* (218), *Hypoſarca* (219), *Hydrocephalus* (217), *Oedema* (230), *&* *Tympanites* (220).

XI. V I T I A.

I. HUMORALIA

CCXXVII. A R I D U R A.

Pars exſucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

CCXXVIII. D I G I T I U M.

Articuli exſiccatio friabilis occulta.
Digiti marcor Dolore periodico inteſiſſimo.

CCXXIX. E M P H Y S E M A.

Flatus intra tunicam celluloſam Partis.
Tumor elaſticus, concolor, ſubdiaphanus, indolens.

CCXXX. O E D E M A.

Lympha ſtagnans intra tunicam celluloſam Partis.
Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, veſpertinus, indolens, Partis.

CCXXXI. S U G I L L A T I O.

Cruor effuſus in tunicam celluloſam.
Tumor obſoletus, latus, luridus.

CCXXXII. I N F L A M M A T I O.

Sanguis obſtructus in vaſis.
Tumor tenſus, calidus, ruber, pulſans, dolens.

CCXXVIII. A B S C E S S U S.

Inflammatio ſuppurata, in *Pus* collecta.
Tumor mollis, æqualis, pruriens.

CCXXXIV. G A N G R Æ N A.

Inflammatio, ſ. Suppuratio ſuffocata, *mortua* ſerpens in tunica celluloſa.
Cutis livens, molliuſcula, putris cum veſiculis ſub epidermide, ſerpente vitio, margine ſubinflammato, ſubardente.

CCXXXV. S P H A C E L U S.

Gangræna (234) omnium ſolidorum partis.

Mor-

Mortificatio putrida ad oſſa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICA.

(*Solutiones Continui*).

CCXXXVI. FRACTURA.

Oſſis ſolutio citra ſubſtantiæ diſſolutionem.

CCXXXVII. LUXATURA.

Geniculi ſolutio citra ſubſtantiæ diſſolutionem.

CCXXXVIII. RUPTURA.

Tendinis ſolutio citra ſubſtantiæ diſſolutionem.

CCXXXIX CONTUSURA.

Fibrarum ſolutio citra ſubſtantiæ diſſolutionem.

CCXL. PROFUSIO.

Sanguinis effluxus copioſus e ſubſtantiæ diſſolution.

CCXLI. VULNUS.

Subſtantiæ diſſolutio partis mollis, hians, cruenta.

CCXLII. AMPUTATURA.

Vulnus *detruncatione* partis totalis factum.

CCXLIII. LACERATURA.

Vulnus Fibrarum Cutiſque *laceratione* factum.

CCXLIV. PUNCTURA.

Vulnus *Tendinis* punctione factum.

CCXLV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

CCXLVI. COMBUSTURA.

Vulnus *igne* factum, inducta Eſchara (281).

CCXLVII. EXCORIATURA.

Cutis remota a Carnibus vivis.

CCXLVIII. INTERTRIGO.

Cuticulæ eroſio madens dolenſque.

CCXLIX.

CCXLIX. RHAGAS.

Fiſſura Cutis arida.

III. EXULCERATIONES.

(*Suppurationes apertæ.*)

CCL. ULCUS.

Vulnus *Suppuratum* partis carnoſæ.

CCLI. CACOETHES.

Ulcus *ſuperficiale* ſerpens, manans, perenne.

CCLII. NOMA.

Ulcus Carnes integumentaque depaſcens, cicatricem inducens.

CCLIII. CARCINOMA.

Ulcus *Scirrhi* (284) ſuppurati.
Ulcus putridum, ſerpens, vaſis tumidis radicatum, periodice dolens.

CCLIV. OZENA.

Ulcus intra antrum *Highmori*.
Ulc. occultum e Naribus fœtens.

CCLV. FISTULA.

Ulcus cortice *calloſo vaginatum*.
Ulc. ſinuoſo penetrans, intus cortice obtectum, ore anguſtatum.

CCLVI. CARIES.

Ulcus *Oſſis* ſeparato perioſtio.
Ulc. connivens, cum raris punctionibus indolens, ſanie paſſim nigra ſe prodens.

CCLVII. ARTHROCACE.

Ulcus *Medullæ* cum oſſis Carie (256).
Ulc. malignum, tumens, dolore oſteocopo (61).

CCLVIII. COCYTA.

Animalculum venenatum intra partem receptum.
Patris ſtigma dolore furioſo.

CCLIX. PARONYCHIA.

Serum corruptum ſub *tendinibus* perioſtioque.
Partis rubor dolentiſſimus os deſtruens.

CCLX. PERNIO.

Partis uſtio *Gelu* facta.
Pars albo cæruleſcens, tempeſtatibus recrudeſcens, ſæpe exulcerans.

CCLXI. PRESSURA.

Digiti inflammatio (232) a *frigore*, in caſum unguis tendens.
Inflam. Digiti circum ungues in ſuppurationem vergens.

CCLXII. ARCTURA.

Unguis curvatura lateralis cutem ſecans.
Inflammat. digiti cum ulceratione laterali unguis.

IV. SCABIES.

* *Multiplicativa.*

CCLXIII. LEPRA.

Puſtulæ (275), Eſchara (281) ſicca colorata, cum *Nodis* immerſis mobilibus indolentibus fuſcis Rhagadibuſque (249).

CCLXIV. TINEA.

Puſtulæ (275) *Capillitii* ſiccæ, eſchara (281) albo-flaveſcente, *Piliſque* abbreviatis erectis bulboſo-radicatis.

CCLXV. ACHOR.

Puſtulæ (275) exulcerantes, manantes communi pinguedinoſo.

CCLXVI. PSORA.

Puſtulæ (275) ichoroſæ, eſcharoticæ (281), noctu imprimis prurigino ſæ (04).

CCLXVII. LIPPITUDO.

Puſtulæ (275) excoriantes *Palpebrarum* margines.

CCLXVIII. S E R P I G O.

Puſtulæ (275) ſiccæ, obſoletæ, ſerpentes, ſubfarinaceo- deſquamantes.

CCLXIX. H E R P E S.

Puſtulæ (275) eſcharoticæ (281), baſi communi eryſipelacea (10).

CCLXX. V A R U S.

Puſtulæ (275) *Glandularum ſebacearum* rubræ, diſperſæ, chronicæ.

CCLXXI. B A C C H I A.

Vari (270) *faciei* cum nodis maculiſque coloratis chronicis.

** *Simplex.*

CCLXXII. B U B O.

Glandula conglomerata inflammata, in ſuppurationem tendens.

CCLXXIII. A N T H R A X.

Glandula ſubcutanea inflammata, in ſuppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, eriſipelaceus (10), immerſus, dolentiſſimus, ſuppurandus apice acuto, puſtula purifera.

CCLXXIV. P H L Y C T Æ N A.

Veſicula ſeroſa, diſtenta, pellucida, baſi inflammata, rupta dolens.

CCLXXV. P U S T U L A.

Veſicula purulenta, turgens, dehiſcens pure.

CCLXXVI. P A P U L A.

Tuberculum farctum, coloratum inflammatum, vix ſuppurandum.

CLXXVII. H O R D E O L U M.

Tuberculum cyſticoſum, ovatum, in limbo palpebrarum, ſuppurans ſæpius apice.

CCLXXVIII. V E R R U C A.

Papilla nervea intumeſcens, indurata.

Papula durior, ſcabra, ſicca, indolens.

CCLXXIX.

CCLXXIX. CLAVUS.

Verruca (278) calloſa, in Tendinibus radicata, baſi ſenſibilis.

CCLXXX. MYRMECIUM.

Verruca (278) madida, mollis, denudata.

CCLXXXI. ESCHARA.

Cruſta mortua, ab humoribus extravaſatis coagmentata, decidua.

V. TUMORES protuberantes.

CCLXXXII. ANEURISMA.

Arteriæ dilatatio.
Tumor mollis, pulſans, concolor, rotundatus.

CCLXXXIII. VARIX.

Venæ dilatatio.
Tumor mollis, quieſcens, concolor, rotundatus.

CCLXXXIV. SCIRRHUS.

Glandula indurata.
Nodus durus, aſper, concolor indolens, rotundatus, preſſione inſenſilis.

CCLXXXV. STRUMA.

Grandula infarcta.
Nodus indolens, ſolidiuſculus, preſſione obtuſe ſentiens.

CCLXXXVI. ATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliuſculus, indolens, abſque cyſtide.

CCLXXXVII. ANCHYLOSIS.

Tumor *Geniculorum*, ligamenti capſulæque tenſione expreſſa Synovia.
Tumor ad genicula, mollis, pulpoſus concolor.

CCLXXXVIII. GANGLION.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulpoſus indolens.

CCLXXXIX. NATTA.

Tumor tunicatus, muſculis irradicatus; eminens, pulpoſus, indolens.

CCXC. SPINOLA.

Tumor ſupra *vertebras lumborum* mollis; exiguus, Vertebrarum proceſſibus dehiſcentibus.

CCXCI. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex *oſſe* prominente enatus.

VI. PROCIDENTIÆ.

CCXCII. HERNIA.

Inteſtini obtecti ultra propriam ſedem protruſio.

CCXCIII. PROLAPSUS.

Viſus nudum relaxatum, elongato propendens ultra proprium locum.

CCXCIV. CONDYLOMA.

Tunica interior relaxata gibba.

CCXCV. SARCOMA.

Caro nuda enata e vivo vulnere.

CCXCVI. PTERYGIUM.

Cuticula excreſcens e cantho, oculi, ſuperficiem ejus obtegens.

CCXCVII. ECTROPIUM.

Palpebra inferior reſupinato-inverſa.

CCXCVIII. PHIMOSIS.

Præputii intumeſcentia inflammata, glandem denudans incarceranſve.

CCXCIX. CLITORISMUS.

Clitoridis intumeſcentia extra ſinum pudoris.

VII.

VII. DEFORMATIONES.

CCC. CONTRACTURA.
Geniculorum fixatio rigida.
CCCI. GIBBER.
Thoracis dilatatio prominens.
CCCII. LORDOSIS.
Oſſium incurvatio.
CCCIII DISTORTIO.
Oſſium ad latus non naturale flexio.
CCCIV. TORTURA.
Oris ad latus flexio.
CCCV. STRABISMUS.
Oculi diſtorti & inæqualiter moti.
CCCVI. LAGOPHTHALMIA.
Oculi ſurſum viſio palpebra ſuperiore abbreviata.
CCCVII. NYCTALOPIA.
Oculi viſus nocturnus.
CCCVIII. PRESBYTIA.
Oculi viſus remotus.
CCCIX. MYOPIA.
Oculi viſus approximatus.
CCCX. LABARIUM.
Dentes vacillantes in ſuis alveolis.
CCCXI. LAGOSTOMA.
Labium ſuperius oris fiſſum.
CCCXII. APELLA.
Præputii abbreviatio abſque inflammatione.
CCCXIII. ATRETA.
Meatus corporis imperforatus.
CCCXIV. PLICA.
Capillorum contortuplicatio indiſſolubilis.

CCCXV.

CCCXV. HIRSUTIES.

Pili copioſiores longioreſque.

CCCXVI. ALOPECIA.

Pilorum defluvium.

CCCXVII. TRICHIASIS.

Ciliorum diſtortio.

VII. MACULÆ.

CCCXVIII. CICATRIX.

Callus replens ulcerationes conſolidatas.

CCCXIX. NÆVUS.

Macula quæcunque congenita.

CCCXX. MORPHÆA.

Macula *alba*, depreſſa, lata.

CCCXXI. VIBEX.

Lineæ *ſanguinicolores* ſubcuticula.

CCCXXII. SUDAMEN.

Maculæ *rubræ*, pulicares, glabræ, pungentes, evaneſcentes.

CCCXXIII. MELASMA.

Macula *cæruleſcens* in parte tecta.

CCCXXIV. HEPATIZON.

Macula *griſeæ*, ſubaſpera, pruriens.

CCCXXV. LENTICO.

Maculæ *griſeæ*, confluentes, inſenſiles.

CCCXXVI. EPHELIS.

Color *fuſcus* partis inſolata.

Heu mihi! tot mortes Homini, quot membra maliſque
Tot ſumus infecti, Mors, ut Medicina putetur.

THEO-

THEORIA.

1 CORPUS vivum conſtat *Medullari* cerebroſo, & *Corticali* ſolido fluidoque.

2 VITA ſentiens movenſque reſidet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo.

3 MEDULLARE arcte cuſtoditum, nervis expanſis tentaculatum, fabricat ſuum corticale ſolidum e fluidis vegetabilium, & fluida hæc viciſſim per ſolida præparat.

4 Medullare hoc *nutritur* tenuiſſimo ſpirituoſo liquido corticali, ſed *flagrat* electrico pulmonibus hauſto.

5 Medullare ſentiens ſe pandit ad *gratum* ſalutare, & movens ſe retrahit ad *ingratum* noxium.

6 Fluidum corticale, e quo ſolida, ſolvitur deſtruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utriſque multiplicativis. Sic vitiatur Sanguis putrido, Serum acido.

7 His dum reſiſtit ſentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticæ* ab aceſcente, *Phlogiſticæ* a putreſcente, at *Exanthematicæ* a vivo peregrino multiplicabili.

8 Fluidorum nociva ingrata eliminare ſtudet vita per vias naturales & artificiales, & quo hæc periculoſiora, eo citius per datam ſic portam ſimul ejecit quævis impura, ſed duas portas ſimul apertas non facile admittit, ne exhauriatur (*a*).

9 Quidquid præcipue adverſum ſentit, præcipue curat vel minora majoribus adſociat (*b*), ut tota ſe his opponat.

10 CORTICALE ſolidum deteritur vitiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diæta*, eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverſe, unde, defectus, *Morbi* dicti.

11.

(*a*) Evacuationes duæ ſimul & ſemel poſſunt vix ſtare.
(*b*) Dolor dolorem trahit.

MORBI tolluntur contraria cauſſa (*a*); hanc ut citius natura obtineat, Toxica miſceantur ingerendis, *Medicamenta* dicta.

12 CONTRARIA hæc ex ſapidis in fluida Solidaque & ex *Olidis* in medullare agentibus dignoſcenda ſunt: E contrariis itaque ſaporibus & odoribus primaria medicamenta eruenda: in his itaque *Clavis Materiæ Medicæ*.

PARS

(*a*) Morbi morbis curantur.

PARS TERTIA.

DEFINITIONES
GENERUM
MORBORUM

A CLARISSIMO

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. ET MED. D. HUJUSQ. PROFESS. &c. &c.

Gottingæ 1764.

QUALITATES

MEDICAMENTORUM.

I. SAPIDA.

Agunt in *Corticale* Vitale:

		in *Fluidis*.	in *Solidis*.		
1	AQUOSA.	Mundificantia, Abſorbentia,	Humectantia. Exſiccantia	SICCA.	1
2	ACIDA.	Refrigerantia, Balſamica,	Attenuantia. Tonica	AMARA.	2
3	DULCIA.	Edulcorantia, Incidentia,	Impinguantia. Corrodentia	ACRIA.	3
4	VISCOSA.	Inviſcantia, Penetrantia,	Lubricantia. Abſtergentia	SALSA.	4
5	PINGUIA.	Obtundentia, Inſpiſſantia,	Emollientia. Adſtringentia	STIPTICA.	5

II. O L I D A.

Agunt in *Medullare* Animatum.

Senſuum	*Excitant*	AROMATICA,	*Sopiunt*	VIROSA.
Motum	*Spaſticant*	ORGASTICA,	*Evacuant*	NAUSEOSA.
Judicium	*Acuunt*	SPIRITUOSA,	*Confundunt*	TETRA.
Libidinem	*Provocant*	AMBROSIACA,	*Suffocant*	HIRCINA.

TABULA CLASSIUM MORBORUM,

I. FEBRES. Innati caloris augmentum præternaturale, cum oris ſiccitate & gravitate corporis.

II. PROFLUVIA. Humorum evacuatio, ab ordine, quantitate aut qualitate naturali abhorrens.

III. EPISCHESES. Excernendorum ſuppreſſiones.

IV. DOLORES. Senſationes moleſtæ, corporis & animi tranquillitatem turbantes.

V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.

VI. ADYNAMIÆ. Senſationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut imminutiones.

VII. HYPERÆSTHESES. Senſationes auctæ, vel perverſæ.

VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis conſtitutio, cum debilitate.

IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

X. VITIA. Mutationes in ſuperficie corporis conſpicuæ.

XI. DEFORMITATES. Aberrationes ſolidorum ab ordine, poſitura, habitu, figura, numero, aliiſque qualitatibus.

I. FEBRES.

I. INTERMITTENTES.

Æſtus ad ſummum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu ceſſat; poſteaque revertitur prævio frigore.

I. SIMPLICES.

I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, ſequente intermittit, tertio repetit.

III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.

IX. QUINTANA.

Singulo quinto die redit.

V. SEXTANA.

Singulo ſexto die repetit.

VI. SEPTANA.

Singulo ſeptimo die revertitur.

VII. OCTANA.

Quolibet octavo die redit.

VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio poſt decimum diem, ſed haud fixo, recurrit.

XI. MENSTRUA.

Viris circa fluxum hæmorrhoidalem, vel etiam citra illum, fœminis circa catamenia accidit.

II.

II. *DUPLICATÆ.*

XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, acceſſionis vero tempora alternis diebus reſpondent.

XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre vacuum habet, & acceſſionis tempora alternatim præcedenti inſultui reſpondent.

III. *TRIPLICATÆ.*

XIV. QUARTANA triplex.

Quotidiana, paroxyſmis quarto quovis die conſpirantibus.

II. CONTINUÆ.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, ſed remiſſiones ſaltem inferunt cum exacerbationibus, quæ vel quotidie, aut tercio die, aut quarto, aliove accedunt.

I. *SIMPLICES.*

XV. QUOTIDIANA Continua

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

XVI. SYNOCHUS.

Facie rubra, cute humida, pulſu magno & frequenti, criſi perfecta terminantur intra 21. dies. Species ejus *Ephemera* eſt.

XVII. AMATORIA.

Febris paucarum horarum a magno frigore incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium conſtans & vehemens.

XIX. EPIALA.

In qua frigoris ſenſus perpetuus cum rigore contingit.

XX. CAUSOS.

Febris ardentiſſima, tertio quoque die acerbior cum immenſa ſiti, & ſicciſſima atque nigra liugua.

XXI. ELODES.

Febris cum profuſiſſimo ac perpetuo ſudore inde a primo die, & magno virium lapſu. *Typhodes* & *Sudor Anglicanus* ejus ſpecies ſunt.

XXII. LETHARGUS.

Febris in qua ſopor & ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum ſopore.

XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide & lethargo mixta.

XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulſus parvus & obſcurus.

XXV. PHRICODES.

Febris cujus decurſum crebri horrores rigoreſve interpellant.

XXVI. LYNGODES.

Febris in qua æger a principio uſque ad criſin ſingultit.

XXVII. ASSODES.

Febris in qua æger fere irrequietus eſt, & implacide moleſteque habet, vel faſtidio agitatur.

XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminoſa alvi dejectione.

XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia ſe intermiſcet.

XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum averſatione liquidorum, ſingultu, convulſione, & delirio.

XXXI.

XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua oſcitatione.

XXXII. ICTERICODES.

Aurignoſa febris, quæ cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagioſa, acutiſſima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut veſiculæ oriuntur cum leipyria, ingenti ſiti, ſpiritu, ſudore, & dejectionibus fœtidis, delirio, nauſea, vomitu, pulſuque parvo ac obſcuro.

XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis ſicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellæ ſubſidentia.

II. COMPOSITÆ.

1. *Exanthematicæ.*

XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagioſa, a vomitu, cephalalgia, & lumbagine incipiens, in qua tertio die maculæ erumpunt, ſenſim in puſtulas purulentas eſcharoticas, deciduas, abeuntes.

XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagioſa, cum tuſſi ſicca & madore oculorum, in qua maculæ rubellæ, lateſcentes, paullum elevatæ erumpunt, quæ deinceps in tenuiſſimas ſquamulas ſolvuntur.

XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut ſenſus punctorius in dorſo, crure, ac inteſtinis, aut ſtupor in digitis, puſtulæ prurientes milii ſeminis magnitudine, rubræ vel albæ, ſero primum limpido, deinceps ſubalbo perlarum colore non diſſimili, plenæ, facie intacta, ſudor multus fœtidus.

XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata morſibus pulicum fere ſimilia, flaveſcentia, rubra, vel livida.

XXXIX.

XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculæ coccineæ crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis ſubflavis, ad inſtar capitis acicularum, ornatæ, fugaces, in ſquamulas dehiſcentes.

XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula punćturis urticarum ſimilia, rubra, prominentia, fugacia

XLI. BULLOSA.

Maligna, veſiculæ ſero ſublimpido repletæ, magnitudine nucis avellanæ & majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

XLII. VARICELLA.*

Variolæ ſpuriæ, ephemera, puſtulæ variolis ſimillimæ prurientes, primo die erumpentes & ſuppurantes, tertio reſiccatæ, & in ſquamulas deciduæ, toto morbo intra ſeptem dies ad ſummum terminato.

XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quæ puſtulas in ore, phlyćtides dićtas, generat.

XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcuſculis in ore ſuperficialibus, fungoſis, quas aphthas vocant.

II. *INFLAMMATORIÆ.*

XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis & vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quæ ſigna vero admodum ambigua.

XLVI.

* Hæc *Varicella* facillime illudere Medicis ſub ſpecie varioloſæ poteſt, niſi ad decurſum accuratiſſime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis exiſtimantur.

XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatæ oculorum inflammatio, ut ſuper corneam feratur, acerbus dolor, perverſio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, & præcipue choroideæ; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internæ; dolor immanis in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua, reſpirandi ac deglutiendi difficultas, præfocationis metus.

L. PLEURITIS.

Pleuræ inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tuſſis ſicca, dyſpnœa.

LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtuſus, gravativus, tuſſis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus anguſtiave.

LIII. MEDIASTINA.

Mediaſtini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad ſternum in inſpiratione, reſpiratione, frequens, tuſſi cum ſputis coloratis, orthopnœa; an ſemper?

LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediaſtina, urgente morbo ſyncope.

LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, ſymptomata fere ut in peripneumonia, ſed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulſus frequens ac inæqualis, hydrophobia; an ſemper?

LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyſpnœa, dolor e regione ventriculi cinguli inſtar ventrem ſupra lumbos ambiens, delirium.

LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris, leipyria dolor & ardor in epigaſtrio, ſitis, vomitus ingeſtorum, ſingultus.

LVII. ENTERITIS.

Inteſtini inflammatio; febris aſodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum & ſtercoris retentio, aut dyſenteria.

LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua hypochondrii dextri dolor tenſivus, tuſſis ſicca, icterus, interdum vomitio bilis & per alvum dejectio.

LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii ſiniſtri diſtentio atque tumor, dolor pulſans, moleſtus dexter decubitus.

LX. MESENTERITIS.

Menſenterii inflammatio; febris varia occulta & lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicæ ſimilis, egeſtiones chyloſæ & ichoroſæ, nullo doloris ſenſu defluentes.

LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore & tumore in regione epigaſtrica & hypogaſtrica.

LXII. PERITONITIS.

Peritonæi inflammatio, febris aſſidua, tumor ventris, & dolor punctorius.

LXIII. MYOCOLITIS.

Muſculorum abdominalium inflammatio; ſymptomata ut in peritonite.

LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notæ deficiunt.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flammea, vel nulla, ſtupor cruris vicini, dolor teſtis vicini, ructus, vomitio.

LXVI. CYSTITIS.

Veſicæ urinariæ inflammatio; febris levior. hypogaſtrii dolor ardens, preſſorius, frequens mejendi ſtimulus, iſchuria, teneſmus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogaſtrii inflammatorius, dolor in lumbis & inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, eryſipelatis expolſionem efficiens.

LXIX. PODAGRICA.

Continua, ſynochos, cum dolentiſſimo rubore in pede

LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. CYSSOTIS.

Ani inflammatio, dolor, teneſmus.

III. *SYMPTOMATICÆ.*

LXXII. APOPLECTICA.

Continua apoplexiæ ſuperveniens.

LXXIII. CATARRHALIS.

Veſpertina, catarrhis ſocia.

LXXIV. RHEUMATICA.

Quotidiana continua rheumatiſmo juncta, multus ſudor, interdum puſtulæ purulentæ.

LXXV. HÆMORRHOIDALIS.

Ephemera, dolor ſpinæ, hæmorrhoides, aut ſaltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

LXXVI. LACTEA.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. VULNERARIA.

Graviori vulneri ſuperveniens.

LXXVIII. SUPPURATORIA.

Partium internarum inflammationibus, dum in ſuppurationes tranſeunt, ſuperveniens, continua.

LXXIX. LENTA.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. HECTICA.

Quotidiana continua vehementior in morbo longo, cum ſudore colliquativa & phthiſi.

II. PROFLUVIA.

I. HÆMORRHAGIÆ.

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profuſio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profuſio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore & faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio per tuſſim

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHŒA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulſi eruptio.

LXXXVII. OTORRHŒA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejuſve cantho aut palpebtis eruptio.

LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; ſanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

XC. HEPATIRRHŒA.

Fluxus hepaticus; diarrhœa acquoſa rubella inſtar loturæ carnium recentium.

XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profuſio.

XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quæ ſanguine urinæ exquiſite permixto perfunditur, ut ea quaſi dilutus & tenuis ſit ſanguis.

XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e veſica dolorifica, qua ſanguis urinam non æqualiter perfundit, ac in imo ſubſidens in grumos concreſcit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit: *Hæmorrhoides veſicæ* appellant.

XCIV. STYMATOSIS.

Hæmorrhagia penis ſine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

XCV. HÆMATOPEDESIS.

Sudor ſanguineus, ſanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

XCVI. MENORRHAGIA.

Sanguinis inordinata & larga ex vulva profuſio.

XCVII. ABORTIO.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum fœtu immaturo aut mola ſubſequente.

II. *APOCENOSES.*

XCVIII. CATARRHUS.

Tuſſis frequens, acris, cum raucitate.

XCIX. EPIPHORA.

Lacrymæ involuntarium profluvium.

C. CORYZA.

Catarrhus narium cum ſeri tenuioris deſtillatione.

CI. OTOPUOSIS.

Puris ex aure effluxus, catarrhus auris ſordidus.

CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidæ retro aurem excretio.

CIII. PTYALISMUS.

Copioſa ſalivæ profuſio.

CIV. VOMICA.

Subitanea, copioſa puris aut ſanguinis nigri e pulmonibus rejectio per tuſſim.

CV. DIARRHOEA.

Copioſum ſinceriorum humorum ex alvo profluvium, ſine vehementi ſenſu doloris.

CVI. PUORRHOEA.

Puris ſinceri ex alvo excretio.

CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca torminoſa ac teneſmodes alvi dejectio.

CVIII. LIENTERIA.

Lævitas inteſtinorum, qua quæ per alvum deſcendunt, alimentis aſsumptis ſubſtantia & colore finitima.

CIX. COELIACA.

Lævium æqualium & quaſi chyli aut cremoris ſpecie dejectio.

CX. CHOLERA.

Vomitusillioſi multi alvique dejectiones, cum periadynia.

CXI. PITUITARIA.

Mera pituitæ, loco ſtercoris, excretio diuturna cum, contabeſcentia.

CXII.

CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitæ ſinceræ & cruentæ ex alvo excretio teneſmodes, periodica.

CXIII. ENEURESIS.

S. incontinentia urinæ, mictio urinæ involuntaria conſtans, ſine acrimoniæ & doloris ſenſu.

CXIV. DIURESIS.

Immodica urinæ prorſus aqueæ excretio, in morbo ſpaſtico, periodica.

CXV. DIABETES.

Immodicum urinæ profluvium diuturnum, ſub quo corpus contabeſcit.

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

CXVII. CHYLARIA.

Urinæ mucoſæ, albæ, paucæ, & quaſi verminoſæ, excretio. *Glus Linn.*

CXVIII. GONORRHŒA.

Invita ſeminis, liquoris, proſtatarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis inſomnia, citraque colis tentiginem, profuſio.

CXIX. LEUCORRHŒA.

Fluor albus; nimia muci aut iſchoris ex vulva profuſio.

CXX. EXONEIROSIS.

Pollutio involuntaria, at jucunda ſeminis ex rigido cole profuſio.

CXXI HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXII. GALACTIA.

Lactis ex mammis ſtillicidium.

CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, ſtimulantis.

CXXIV. ECPHYSE.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. DYSODIA.

Exhalatio fœtida ex toto corpore, aut ejus parte.

III. EPISCHESES.

CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene ſonora, ſpiritu nonnihil difficili, qui nec niſi hiante ori duci poteſt.

CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita ſupra infraque expulſio, cum intumeſcentia ventris.

CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

CXXIX. ISCHURIA.

Urinæ ſuppreſſio.

CXXX. AMENORRHŒA.

Menſtrui ſanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.

CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum ſuppreſſio aut imminutio.

CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

IV. DOLORES.

CXXXIV. ANXIETAS.

Moleſta ſenſatio circa præcordia, quæ præſentem rerum ſtatum faſtidit.

CXXXV. BLESTRISMUS.

Incontinens corporis jactatio & inquietudo.

CXXXVI. PRURITUS.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad ſcalpendum excitans.

CXXXVII. CATAPSYXIS.

Senſus frigoris dolorificus in parte muſculoſa aut cutanea.

CXXXVIII. RHEUMATISMUS.

Cutis & muſculorum dolor. *Lumbago*, *iſchias*, *gloſſagra*, & *pleurodyne Sauvag*. ſunt ſpecies.

CXXXIX. ARTHRITIS.

Articulorom dolor; cujus ſpecies *chiragra* & *gonagra*.

CXL. CEPHALALGIA.

Capitis dolor brevis.

CXLI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum ſenſu frigoris.

CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tenſivus alterutrum ejus latus occupans.

CXLIV. CAREBARIA.

Moleſtia capitis velut gravitas quædam.

CXLV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

CXLVI. HÆMODIA.

Dentium ſtupor cum dolore.

CXLVII. ODAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internæ & externæ.

CXLIX. ACATAPOSIS.

Deglutitio difficilis.

CL. CIONIS.

Dolorifica uvulæ craſſities.

CLI. HIMANTOSIS.

Ejuſdem ſolito major longitudo & gracilitas.

CLII. CARDIOGMUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum ſenſu ponderis & pulſatione.

CLIII MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces aſſugens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus diſtentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens ſpaſticus cum nauſea ſæpeque vomitu.

CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in ſtomacho cum inextinguibili ſiti.

CLIX. NAUSEA.

Inane vomendi deſiderium.

CLX. COLICA.

Dolor ſpaſticus inteſtinorum cum obſtipatione, nauſea, & vomitu.

CLXI. EILEMA.

Dolor in inteſtino fixus velut clavi muro impacti.

CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excrementorum.

CLXIII. STRANGURIA.

Urinæ denſæ rubræ mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta.

CLXIV. DYSURIA.

Urinæ ſtillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropœticis, cum arenulis in urina ſubſidentibus.

CLXVI. TENESMUS.

Impetuoſa, dolorifica deſidendi cupiditas, qua nihil præter pauca mucoſa & cruenta egeritur.

CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvageſ. & Linn.*

CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra Linn.*

CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium ſimilis.

CLXX. DYSMENORRŒA.

Profluvium ſanguinis uterini menſtruum dolorificum.

CLXXI. DYSDOCIA.

Partus laborioſus, difficilis.

CLXXII. ATOCIA.

Partus difficillimus, qui ſine arte prorſus abſolvi non poteſt.

CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis ſtimulum.

CLXXIV PSORIASIS.

Durities ſcroti cum intenſa prurigine, & interdum quoque exulceratione.

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthiticus in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in oſſe fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Strepitus oſſium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per tractum majorum cutis vaſorum oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus. In aure dicitur *Pyroſis*.

V. SPASMI.

CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut ſolius cervicis diſtentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud poſſit.

CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem diſtentio, ſed qua corpus in poſteriora curvatur.

CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, ſed qua corpus in anteriora curvatur.

CLXXXIII. CATOCHUS.

Tetanus cum privatione ſenſuum.

CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membri ſingularis concuſſio ſine frigoris ſenſu.

CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremæ partes membrorum inalgeſcunt.

CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis algor cum tremore.

CLXXXVII.

CLXXXVII. RIGOR.

Idem & violentior cum triſmo & ſenſu frigoris in interioribus partibus.

CLXXXVIII. EPILEPSIA.

Agitatio convulſiva univerſalis, chronica, periodica; cum oppreſſione ſenſoriorum; exituque ſpumæ ex ore.

CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepſia acuta.

CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulſiva, continua; chronica, cum integritate ſenſuum.

CXCI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate ſenſuum.

CXCII. RAPHANIA *Linn.*

Convulſio cum ſpaſtica articulorum contractione & dolore immani, periodica.

CXCIII. CHOREA.

Convulſio ſaltatoria aut procurſiva. *Tarantiſmus* eſt ſpecies.

CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum extenſio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.

CXCV. SCELOTYRBE.

Immanis continua crurum contractio & obrigeſcentia

CXCVI. ANGONE.

Faucium præfocatio acuta, ſine inflammatione. *Agina convulſiva & Suffocatio hyſterica* ejus ſunt ſpecies.

CXCVII. GLOSSOCELE.

Linguæ violenta, acuta, extruſio.

CXCVIII. GLOSSOCOMA.

Linguæ violenta, acuta, revulſio.

CXCIX. HIPPOS.

Oculorum conſtans agitatio; malum ab ortu contractum.

CC. ILLOSIS.

Oculorum perverſio acuta.

CCI. CINCLESIS.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occluſio ſpaſtica, acuta.

CCIII. CILLOSIS.

Cilii ſuperioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranæ narium agitatio convulſiva, impetuoſam aeris inſpirationem, ſimilemque mox expulſionem per nares cum ſtrepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulſiva & ſonora aeris e pulmonibus expulſio.

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter ſe colliſorum.

CCVIII. CAPISTRUM, *ſ. Spaſmus Maxillæ inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS. *ſ. Spaſmus Cynicus.*

Spaſmus muſculorum faciei & oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *ſ. Riſus Sardonius.*

Involuntarius riſus, ſub quo animus non gaudio, ſed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS,

Suffocatio in inſomnio terrifico, reſpirationem offendens, vocemque intercipiens.

CCXII. SINGULTUS.

Inſpiratio convulſiva ſubitanea velociſſima, ſonora recurrens.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, viſceris, muſculi, tendinis, arteriæve, temporaria agitatio.

CCXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os rejectio.

CCXV. RUCTUS.

Violenta flatus ventriculi incluſi per os exploſio.

CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os viciſſim maſticandus iterumque deglutiendus, citra voluntatem impellitur.

CCXVII. ŒSOPHAGISMUS. *ſ. Spaſmus œſophagi.*

Ciborum deglutitorum in œſophago ſubſiſtentium remora dolorifica.

CCXVIII. HYPOCHONDRIASIS.

Anxietas præcordialis cum ſpaſmis ventriculi ac inteſtinorum, variiſque congeſtionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS. *ſ. Æſtus volaticus.*

Subitus fugaxque æſtus cum rubore faciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primæ phalangis digitorum invita & conſtans incurvatio.

VI. ADYNAMIÆ.

CCXXII. L A S S I T U D O.

Ingrata & gravativa ſenſatio impotentiæ ad motum

CCXXIII A S T H E N I A.

Languor aut debilitas corporis.

CCXXIV. T O R P O R.

Senſus motuſque imminutus in parte carnea.

CCXXV. A D Y N A M I A.

Impotentia, qua ſe ægri nullo modo movere aut in lecto erigere poſſunt.

CCXXVI. P A R A L Y S I S.

Senſus motuſve aut utriuſque defectus in ſingulari parte externa.

CCXXVII. P A R A P L E G I A.

Omnium partium ſub collo, aut ſaltem medii corporis artuumque inferiorum paralyſis.

CCXXVIII. H E M I P L E G I A.

Paralyſis alterutrius lateris.

CCXXIX. A P O P L E X I A.

Subita functionum animalium ceſſatio, cum ſtertore & magno pulſu.

CCXXX. CATALEPSIS. *ſ. Catoche*.

Subita functionum animalium ceſſatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articuliſque eum ſitum, qui ipſis datur.

CCXXXI. C A R U S.

Veternus ſopor, liberam reſpirationem ſine ſtercore conſervans, ex quo ægri vix excitantur.

CCXXXII. C O M A, *ſ. Cataphora*.

Sopor in quo ægri vellicati evigilant, & mox in ipſum relabuntur.

CCXXXIII.

CCXXXIII. SOMNOLENTIA.

Inclinatio in ſomnum juſto major.

CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum ſubapparitio.

CCXXXV. PTOSIS.

Impotentia attollendi palpebram ſuperiorem.

CCXXXVI. AMBYOPIA.

Viſus imbecillitas integro oculo.

CCXXXVII. MYDRIASIS.

Pupillæ dilatatio, quæ viſioni nocet.

CCXXXVIII. AMAUROSIS.

Cæcitas ſine ſenſibili oculorum labe, præter mydriaſin.

CCXXXIX. CATARACTA.

Cæcitas cum obſcurata lente, retro pupillam conſpicua.

CCXL. SYNIZESIS.

Cæcitas cum pupillæ coalitione.

CCXLI. GLAUCOMA.

Cæcitas turbatis humoribus & oculo flaccido.

CCXLII. ACHLYS.

Corneæ obſcuritas visum imminuens aut tollens.

CCXLIII. NYCTALOPIA.

Viſus noctu ſaltem contingens.

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Viſus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Viſus dimidiatus.

CCXLVI. DYSICOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Guſtus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obſcuritas.

CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum ſtridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox aſpera & obſcura, quæ vix niſi a prope adſtantibus exaudiri poteſt.

CCLIII. APHONIA.

Vocis privatio.

CCLIV. LEPTOPHONIA.

Vitium vocis nimium gracilis.

CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis edi ſolet cum ejulatu & planctu.

CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox naſalis, quæ ex naribus haud ſimul editur.

CCLVII. MUTITAS.

Loquelæ privatio.

CCLVIII. TRAULOTIS, *Blæſitas*.

Vitioſa literarum *ſ* & *r* pronunciatio.

CCLIX. PSELLOTIS. *Balbuties*.

Cum inter pronunciandum aut litera aut ſyllaba aufertur & eliditur.

CCLX. ISCHNOPHONIA.

Vitium pronunciationis, quoſyllaba ſyllabæ cito copulari non poteſt.

CCLXI. BATTARISMUS.

Vitium pronunciationis, quo ſermo præcipitatur, unaque ſyllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

CCLXII.

CCLXII. SUSPIRIUM.

Inſpiratio lenta, profunda, gemebunda.

CCLXIII. OSCITATIO.

Inſpiratio tarda, profunda, aperto ore.

CCLXIV. PANDICULATIO.

Oſcitatio cum artuum extenſione.

CCLXV. APNŒA.

Reſpiratio adeo rara & parva, ut plane ſpiritus periiſſe videatur.

CCLXVI. MACROPNŒA.

Reſpiratio per larga intervalla contingens.

CCLXVII. DYSPNŒA.

Reſpirandi difficultas continua, levior.

CCLXVIII. ASTHMA.

Reſpiratio difficilli periodica, chronica cum ſenſu anguſtiæ in faucibus.

CCLXIX. ORTHOPNŒA.

Reſpiratio ſuffocatoria acuta, non niſi erecto cervice peragenda.

CCLXX. PNIGMA, *Catarrhus ſuffocativus*.

Difficillima reſpiratio, cum ſubitanea ſenſuum motuſque interceptione, ſtertore pulſuque intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, ſ. *Stertor*.

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHMOS, ſ. *Ronchus*.

Sonus ſtertorosus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMIA.

Subita ſenſus motuſque interceptio, cum ſudore frigido, tinnitu aurium, pulſu ac reſpiratione debili.

CCLXXIV. SYNCOPE.

Eadem gravior, nullo pulſu, nulla reſpiratione perceptibili, abolitoque omni ſenſu, & extincto calore.

CCLXXV.

CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulſus.

CCLXXVI. APEPSIA.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. DYSPEPSIA.

Tarda difficiliſque concoctio.

CCLXXVIII. DIAPTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. ANOREXIA.

Inappetentia ſine faſtidio ciborum.

CCLXXX. ANATROPE.

Inappetentia nauſeabunda.

CCLXXXI. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CCLXXXII. AGYISIS.

Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. AGENESIA.

Rei venereæ impotentia in viro: libidinis defectus.

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

VII. HYPERÆSTHISES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum viſu, olfactu, aut guſtu percipiendarum, talis averſatio, ut ex earundem perceptione gravia ſymptomata inducantnr.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obverſantium, quæ non adſunt.

CCLXXXVIII.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua ſubito viſui omnia nigra ſe repræſentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos coruſcans.

CCXCI. DYSOPIA.

Viſus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non exiſtentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum ſemetipſo circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLYDIPSIA.

Continuum potus deſiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu ſubſequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non eſculentarum devoratio arbitraria.

CCC. MALACIA.

Earundem anxia appetentia.

CCCI. PICA.

Certi cibi aſsumendi, aut rei olfaciendæ vehemens deſiderium.

CCCII. BOMBUS.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

CCCIII. CELSA.

Senſus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium ſubter cute.

VIII. CACHEXIÆ.

CCCIV. CACHEXIA.

Corpus grave atque iners, colore pallido ſqualidum.

CCCV. CHLOROSIS.

Cachexia in virginibus colore ex pallido vireſcente.

CCCVI. ICTERUS.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obſcure rubra, tingente immiſſa linteamina colore croceo.

CCCVII. MELANCHLORUS.

Cachexia cum ſubnigro cutis colore, urina de nativo ſtatu haud decedente.

CCCVIII. ATROPHIA.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, ſine febre lenta & hectica.

CCCIX. TABES.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at ſine dyſpnœa & tuſſi.

CCCX. PHTHISIS.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, dyſpnœa, & tuſſi (*).

CCCXI. HYDROTHORAX.

Cachexia cum dyſpnœa & effuſione aquæ intra pectus ſtrepitum concuſſione intus facientis.

CCCXII.

(*) In *atrophia* ſola pinguedo abſumitur, nec æque reſtituitur, in *tabe* & *phthiſi* caro ſimul minuitur.

CCCXII. RACHITIS.

Atrophia infantum cum epiphyſium protuberantia.

CCCXIII. ANASARCA.

Totius corporis intumeſcentia, aquoſa, mollis, digiti impreſſi veſtigium aliquandiu retinens, cum pallore cutis.

CCCXIV. ASCITES.

Tumor abdominis, ſcroti, & crurum aquoſus, cum atrophia ſuperiorum partium.

Abdomen impulſum ſonum collectæ permotæque intus aquæ præbet.

CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops ſaccatus pleuræ, peritonæi, aut viſceris abdominalis.

CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominalis renitens, pulſatione ſonitum edens cum obſtipatione & atrophia.

CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogaſtrii ab utero flatu diſtento.

CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum laſſitudine, maculis artuum lividis, ſtomacace, ulceribus.

CCCXIX. SIPHYLIS.

Cachexia contagioſa ex contagio venereo, cum tumoribus oſſium & ulceribus faucium partiumque obſcœnarum, prægreſſis plerumque bubonibus aut gonorrhœa.

CCCXX. LEPRA *Græcorum*, *ſ. Pſora*

Pertinaciſſima ſcabies totius corporis vel partis, ſicca, dura, aſpera, ſerpentibus puſtulis furfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, *ſ. Lepra Arabum*.

Mutatio cutis in tumores lividos, duros, ſaniem fœtidam cruſtoſam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido & duro.

CCCXXIII. PLICA, *ſ. Rhopaloſis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoso ita in cirrhos contorquentur, ut explicari nullo modo poſſint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copioſe emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumeſcentia abdominis longa, a magnitudine habituve viſceris mutato.

CCCXXVI. PARACYISIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno ſitu fœtus extra uterum.

CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatæ partis livor & mortificatio fœtida, cum puſtulis ichoroſis, ſenſus doloris habens.

CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars ſenſum motum & innatum calorem tota amiſit, ſitque prorſus nigra, mollis, putris, & cadaveroſa.

IX. PARANOIÆ.

CCCXXIX. ATHYMIA.

Animi abjectio, conſternatio, triſtitia, deſperatio.

CCCXXX. DELIRIUM. *Paraphroſyne.*

Mentis alienatio in febre haud conſtans, nec furibunda. *Carpologia* ejus eſt ſpecies.

CCCXXXI. MANIA.

Inſania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* & *ſatyriaſin* pro ſpeciebus habeo.

CCCXXXII.

CCCXXXII. MELANCHOLIA.

Inſania longa cum mœſtitia ac timore. *Noſtalgia* ejus ſpecies eſt.

CCCXXXIII. ECSTASIS.

Inſania, quæ brevi tempore durat.

CCCXXXIV. ECPLEXIS.

Exceſſus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa cauſa affertur.

CCCXXXV. ENTHUSIASMUS.

Eſt veluti cum quidam in ſacris faciendis mente capiuntur, ſi qua viderint audiverintve.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Moroſis*, *Fatuitas*.

Mentis imminuta & infirmata functio, ſeu quædam ignavia, citra delirium & ſoporem.

CCCXXXVII. AMENTIA, *Anoia*.

Imaginationis vel mentis occaſus atque privatio, qua jam ab ipſo ortu affecti vix mentis inopia loqui diſcunt.

CCCXXXVIII. OBLIVIO.

Memoriæ privatio.

CCCXXXIX. SOMNIUM.

Viſum, quod in ſomno occurrit, tanquam verum ſi exiſtimatum. *Pavor* ejus eſt ſpecies.

CCCXL. HYPNOBATASIS.

Somnium in quo homo aſſurgit, ambulat, & diverſa vigilantium opera exercet.

X. VITIA.

I. INFLAMMATIONES.

CCCXLI. OPHTHALMIA.

Inflammatio albi oculorum.

CCCXLII. BLEPHAROTIS.

Inflammatio palpebrarum.

CCCXLIII. ERYSIPELAS.

Inflammatio lata cutis, quæ ſplendet & leviter ac æqualiter tumet.

CCCXLIV. HIEROPYR.

Eryſipelas cum eminentibus ardentibus puſtulis. *Zoſter* dicitur, ſi abdominis cutem occupat.

CCCXLV. PARONYCHIA.

Inflammatio dolorifica in ſummitate digitorum.

CCCXLVI. ONYCHIA.

Inflammatio digiti lateralis ab ungue profundius in cutem demerſo.

CCCXLVII. ENCAUSIS.

Inflammatio cutis ab uſtione.

CCCXLVIII. PHIMOSIS.

Inflammatio, aut œdematodes tumor præputii, quo glans nudari non poteſt.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatio præputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non poſſit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

II. TUMORES.

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, ovi ſaltem gallinacei magnitudine.

CCCLII.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apoſtematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

CCCLIII. ANTHRAX.

Quaſi malignus furunculus, qui partem mox adurit, puſtulas circum ſe ardentiſſimas ciet, tandem cruſta nigra vel cinerea obducitur, & corruptæ carnis globum excutit, qua excidente ulcus cavum ſordidumque manet.

CCCLIV. ABSCESSUS.

Collectæ in inflammato loco materiæ in pus aut in alienam ſubſtantiam converſio.

CCCLV. ONYX.

Abſceſſus inter corneæ laminas.

CCCLVI. HIPPOPYON.

Abſceſſus intra oculum.

CCCLVII. PHYGETHLON.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII. EMPYEMA.

Abſceſſus in thorace, latus aut partem ejus in tumorem attollens, cum febre hectica, prægreſſa pleuritide vel peripneumonia.

CCCLIX. PHYMA.

Tumor glandularum, ſimplici plegmone atque phygethlo minor, planior, minuſque rubens ac dolens.

CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cute ſubito erumpentia, modo colorem cutis non excedentia, modo rubra fugaciſſima.

CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula puncturis urticarum ſimilia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis ſine inflammatione.

CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apoſtematodes in cantho oculi interno.

CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida.

CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum & inflammatum.

CCCLXVII. SCROPHULA.

Tumor glandularum colli & meſenterii indolens obduratus.

CCCLXVIII. BUBON.

Tumor glandulæ inquinalis.

CCCLXIX. BRONCHOCELE.

Tumor glandulæ thyreoideæ.

CCCLXX. PAROTIS.

Tumor glandulæ ejuſdem nominis.

CCCLXXI. GONGRONA.

Collum tumidum.

CCCLXXII. SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

CCCLXXIII. COILIMA.

Intumeſcentia abdominis ſubita, flatulenta.

CCCLXXIV. SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CCCLXXV. CANCER.

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inæqualis, liveſcens aut nigricans.

CCCLXXVI. SARCOMA.

Carnis incrementum tuberculi tumoriſve ſpecies.

CCCLXXVII. POLYPUS.

Sarcoma intra nares, prælongum, pluribus appendicibus adharens.

CCCLXXVIII. CONDYLOMA.

Turberculum durum, pene indolens in ani margine. Ejus ſpecies *Ficus* & *Thymus* a figura ita dictæ.

CCCLXXIX. GANGLION.

Tumor durus, concolor, indolens tendini inſidens.

CCCLXXX. RANULA, *Batrachus*.

Tumor ad frenulum linguæ folliculoſus, materiam ſpiſſam aut tofaceam complexus.

CCCLXXXI. TERMINTHUS.

Tuberculum rotundum, nigrum, præſertim in tibiis enaſcens, humorem glutinoſum & ſubrubrum exulceratione emittens.

CCCLXXXII. ŒDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumſcriptus aut diffuſus, preſſo digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCELE.

Cerebrum per hiatum calvæ extrorſum eminens.

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monſtroſus tumor a collecta aqua in cute aut ſubter calvaria.

CCCLXXXV. HYDROPHTHALMIA.

Totius oculi cum aliquo dolore, adeo ut is palpebris operiri non poſſit.

CCCLXXXVI. SPINA *bifida*.

Tumor aquoſus exiguus, in nucha aut inferiore ſpinæ loco, poſterioribus vertebrarum dehiſcentibus proceſſibus emergens.

CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem conſiſtente.

CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus teſtis comprehenditur, aquoſus.

CCCLXXXIX. HYDROPS *Scroti*.

Tumor tunicæ ſcroti celluloſæ aquoſus.

CCCXC. STEATITES.

Abdominis intumeſcentia pinguedinoſa, graviditatem mentiens.

CCCXCI. PNEUMATOSIS.

Totius corporis intumeſcentia a flatu.

CCCXCII. EMPHYSEMA.

Tumor mollis, frigidus, in ſingulari parte ab aere celluloſum cutis habitum ingreſſo formatus.

CCCXCIII. HYSTEROPTOSIS.

Uteri vel vaginæ procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CCCXCIV. CYSTOPTOSIS.

Membranæ veſicæ urinariæ interioris protuberantia extra urethram.

CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Inteſtini recti procidentia.

CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annulo muſculi obliqui ab ingreſſo inteſtino omentove, vel utroque conjunctim.

CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in ſcroto tumor.

CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor aſi inteſtino infra ligamentum Poupartii elapſo.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovularis*.

Hernia inteſtinalis foraminis ovalis, in ſuperiori & interna femoris parte prope perinæum.

CCCCI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab inteſtino per hiatum intra ligamenta ſacro-iſchiatica elapſo.

CCCCII.

CCCCII. ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

CCCCIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia inteſtini ventralis.

CCCCIV. CYSTOCELE.

Prominentia veſicæ per muſculi obliqui annulum, ſub qua urina nonniſi preſſo exterius tumore redditur.

CCCCV. CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioſo & hydropico compoſitus.

CCCCVII. VARIX.

Tumor venæ mollis, lividus, aut niger.

CCCCVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriæ mollis & pulſans.

CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque ſpermaticarum inæqualis, renitens.

CCCCX. GASTROCELE.

Hærnia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden & umbilicum inque ipſo illo, poſt paſtum auctus, dolore ſtomachi, vomitionibuſque ſtipatus.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquoſus & varicoſus tumor vaſorum teſtis.

CCCCXV. SARCOCELE

Teſtis ſarcoma aut ſcirrhus.

CCCCXVI. PHYSOCELE

Tumor a flatu herniam mentiens.

CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in oſſe circumſcriptus.

CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius oſſis.

CCCCXIX. PÆDARTHOROCACE.

Tumor oſſis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana incluſus, & materiam ſpiſſam complexus. *Atheroma*, *Steatoma*, *Teſtudo*, *Talpa*, *Meliceris* ejus ſpecies.

CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneæ obſcuratæ.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS

Procidentia uvæe ex cornea diſrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, œdematodes.

CCCCXXIV. TOFUS.

Tuberculum ad articulum, tofacœm materiam complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. FLEMEN.

Tumor pedis circa talos.

*III. EXTUBERANTIÆ**.

CCCCXXVI. VERRUGA.

Tuberculum ſupra cutim durum, aſperum ſeſſile vel penſile. Unde ſpecies *Athrobordon*, *Acrotymium*, *Myrmæcium*

CCCCXXVII.

(*) Extuberantiæ ſupra cutim eminent; tumores intra aut ſubter eam exiſtunt.

CCCCXXVII. PORRUS.

Verruca in obſcœnis, mollis, madida, tactu dolens.

CCCCXXVIII. CLAVUS.

Tuberculum album rotundum, calloſum, in digitis plantiſque pedum.

CCCCXXIX. CALLUS, ſ. *Tylloma.*

1. Obdurata ſumma cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quæ ſine ſenſu eſt, in ulcere.

CCCCXXX. ENCANTHIS.

Intumeſcentia carunculæ lacrymalis.

CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungoſum, molle in interiori palpebra.

CCCCXXXII. PINNULA.

Excreſcentia corneæ tunicæ inhæreſcens.

CCCCXXXIII. PTERYGIUM.

Excreſcentia, membranulæ forma, rubra ſupra album oculi.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, *Crithe.*

Tuberculum calidum in abſceſſum fere deſinens, quod e palpebræ margine atque e cilio prorumpit.

CCCCXXXV. GRANDO.

uberculum durum, palpebræ fere ſuperiori innaſcens.

CCCCXXXVI. VARUS, *Ionthos.*

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere calloſum, diſperſum, multiplex.

CCCCXXXVII. GUTTA, *Roſacea.*

Varus quaſi confluens, cum rubedine aſpera maculoſa.

CCCCXXXVIII. EPHELIS.

Aſperitas quædam & durities mali coloris in facie.

CCCCXXXIX. ESOCHE.

Tuberculum intus in ano latens.

CCCCXL.

CCCCXL. EXOCHE.

Idem foris eminens.

IV. *PUSTULÆ & PAPULÆ.*

CCCCXLI. EPINYCTIS.

Puſtula ardens, alba, ſubrubra aut ſublivida, ſanie ſubcruenta repleta, ciceris aut fabæ magnitudine, circa quam vehemens inflammatio & dolor.

CCCCXLII. PHLYCTÆNA.

Puſtula ſubflavo humore diſtenta, lucida, ilii ſimilis, quæ ab ambuſtione erumpit, non manifeſto dolens. In capite *Pſydracium* vocatur.

CCCCXLIII. HERPES, *Serpigo*.

Papula ardens, cutem ſerpentibus minimis puſtulis erodens. *Purpura ſcorbutica*, quam vocant, veriſſima *ſerpigo* eſt.

CCCCXLIV. SCABIES.

Durities cutis rubicundior, ex qua puſtulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam ſicciores, ſaniem rodentem, exulcerantem, cruſtas formantem, & contagioſam complexæ.

CCCCXLV. AQUULA.

Puſtula palpebrarum, vel pinguis quædam materia, cuti earundem ſubſtrata.

CCCCXLVI. HYDROA, *Boa*, *Sudamina*.

Puſtulæ milii magnitudine, aquoſæ, ſine rubore & ſine ullo dolore, ex ſudoribus repente ſparſim toto corpore emergentes.

CCCCXLVII. VARIOLA.

Puſtula purulenta ex macula rubra in ſynocho emergens, contagioſa.

CCCCXLVIII. VARICELLA.

Puſtula ſimilis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagioſa.

CCCCXLIX. PURPURA.

Puſtula pruriens, ſeminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. ENCAUMA, *Phlyzacion*.

Puſtula ab uſtione contracta.

V. *MACULÆ.*

CCCCLI. ECCHYMOMA.

Macula a ſanguine per cutem quaſi effuſo livida vel nigra. Illa *Pelioma*, hæc *Melaſma* ſpeciatim dicitur.

CCCCLII. PETECHIÆ.

Maculæ pulicum morſui ſimiles, magnitudine & colore, interdum tamen etiam lividæ in febre acuta.

CCCCLIII. MORBILLI.

Maculæ acutæ, rubellæ, lateſcentes, & plerumque confluentes, inque ſquamas defluentes, in febre acuta.

CCCCLVI. SCARLATÆ.

Maculæ latiores ac rubicundiores quam morbilli; ſubflavis nodulis ornatæ, in febre acuta.

CCCCLIV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fuſca, multiplex, in facie potiſſimum & in manibus emergens.

CCCCLVI. URTICARIA.

Maculæ ſubtumidæ, rubentes, prurientes, fugaces.

CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

CCCCLIX. VITILIGO.

Macula fœda, fere ſubaſpera, diſperſa, ſerpens, alba (*Alphos*), aut nigra (*Melas*).

CCCCLX.

CCCCLX. L E U C E.

Alphos in qua albi & lanugini ſimiles pili.

CCCCLXI. C Y A S M A.

Macula fuſca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. L I C H E N. *Impetigo.*

Macula ſubrubra aſpera, dura, ſicca, cum ingenti prurigine.

CCCCLXIII. S E L I N E.

Macula alba in ungue.

CCCCLXIV. N E B U L A.

Macula alba in cornea.

VI. *D I S S O L U T I O N E S.*

1. *Apoſpaſmata.*

CCCCLXV. V U L N U S.

Solutio partis ſolidæ, mollis a cauſa mechanica, cum effluxu ſanguinis.

CCCCLXVI. R U P T U R A.

Solutio partis ſolidæ, mollis, internæ, ab interna cauſa, cum hæmorrhagia.

CCCCLXVII. R H A G A S.

Solutio cutis linearis arida.

CCCCLXVIII. F R A C T U R A.

Diſſolutio oſſis tranſverſa aut obliqua.

CCCCLXIX. F I S S U R A.

Eadem recta, & ut ligni in longitudinem.

CCCCLXX. P L I C A T I O.

Oſſium longorum concuſſio & contorſio citra fracturam.

CCCCLXXI. T H L A S I S.

Calvaria depreſſa citra fracturam.

CCCCLXXII. LUXATIO.

Dimotio oſſis ex articulo ſuo perfecta.

CCCCLXXIII. SUBLUXATIO.

Cum os ab oſſe paulum receſſit, eaque inter ſe dehiſcunt.

CCCCLXXIV. DIACHALASIS.

Suturæ dimotio.

CCCCLXXV. ATTRITIO, *Ecthlimma.*

Diſſolutio cuticulæ & cutis a compreſſione.

CCCCLXXVI. PRORIGO, *Pityriaſis*

Reſolutio cutis in tenues ſquamulas deciduas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abraſio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Oſſis corrupti ſquamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species ſolutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis muſculorumque conquaſſatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut ſubſtantiæ manifeſtam deperditionem.

CCCCLXXXI DIABROSIS.

Eroſio cutis a re acri & mordaci interna vel externa.

CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiſcens a viva carne, & in cruſtam emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis deſtructio & caſus.

2. *Exulcerationes.*

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque caloſis.

CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computreſcit, atque mollis & cadaveroſa reddita tetrum odorem exhalat.

CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri converſio in ulcus, quod nigrum eſt, putridum, teterrimi odoris, & vehementer dolet.

CCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus ſerpens, ſed ſolam cutem rodens ac depaſcens.

CCCCLXXXIX. NOMA.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, ſed & vicinas exedit & abſumit.

CCCCXC. SYCOSIS.

Ulcus, in quo multa caro excreſcit.

CCCCXCI. FISTULA.

Ulcus altum, anguſtum, calloſum.

CCCCXCII. SINUS.

Ulcus altum, quod ab anguſto ore orſum intus curvatum ampliatur, ſine callo.

CCCCXCIII. CARIES.

Ulcus in oſſe cum ſubſtantiæ & perioſtei corruptione, qua os ſpongioſum & friabile redditur.

CCCCXCIV. ACHORES.

Ulcuſcula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis & glutinoſa ſanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. CRUSTA *lactea.*

Achores in facie.

CCCCXCVI. FAVUS, *Cerion.*

Ulcus multis foraminibus, ſed majoribus ac in achore,

re, pervium, ex quibus melli ſimilis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus muſculoſis, articulis, & plantis pedum, oritur.

CCCCXCVII. TINEA.

Ulcus capitis, quod denſiſſimam, duriſſimam, aridiſſimamque cruſtam facit, ſerpens, pilis abbreviatis.

CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus converſum.

D. OZÆNA.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exſtillat.

DI. APHTHÆ.

Ulcera oris aut pudendorum, ſuperficiaria, mucoſa.

DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a ſudoris vel urinæ acrimonia.

DIII. RHACOSIS.

Excoriatio ſcroti laxati.

VII. CONCRETIONES.

DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter ſe conglutinatio.

DV. SYNIZESIS.

Pupillæ concretio.

DVI. DACRYOMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguæ concretio cum partibus ſubjectis, loquelam, ſuctum, deglutitionemque impediens.

DVIII. ANCYLOSIS.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extenſio prohibetur.

DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. *Leocoma* in cornea dicitur.

DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum & faſtigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia ſpinæ dorſalis, omoplatæ, oſſiumve thoracis. Ejus ſpecies *Cyphoſis*, *Lordoſis*, *Scolioſis*, & *Seiſis*.

DXIII. CAPUT *obſtipum*.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum diſtortio & inæqualis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum vel nihil omnino.

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium ſuperioris palpebræ, ſi illa parum deſcendit, oculumque non claudit.

DXVII. TRICHIASIS.

Obverſio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebræ inferioris, quo parum ſurſum attollitur, ſed hiat, aut extrorſum everſa eſt.

DXIX. ENTROPIUM.

Palpebræ inferioris inverſio introrſum.

DXX.

DXX. RHOEAS.

Defectus carunculæ lacrymalis, epiphoram faciens.

DXXI. RHYSSEMATA.

Rugæ & ſordes, quæ in ſenili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHEILOS, *Labium leporinum*.

Diviſum ſemel vel bis labium.

DXXIII. MALACOSTEON.

Oſſium mollities.

DXXIV. HIRSUTIES.

Præternaturalis pilorum in parte generatio.

DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam ætatem.

DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

DXXVII. XIRASIA.

Lanuginoſa pilorum ſuperficies, quaſi pulvere ſint conſperſi.

DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum caſus, qui tabeſcentibus & ex morbo graviore convaleſcentibus evenit.

DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophiaſis* ejus ſpecies, item *Calvities* & *Pelada*.

DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duritie calloſa palpebrarum.

DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulæ in parte aliqua corporis.

DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris prælonga.

DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculave congenita.

DXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

DXLI. ISCHNOTIS.

Exceſſiva corporis gracilitas.

DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

DXLIII. VARUS.

Cui crura introrſum verſa.

DXLIV. VALGUS.

Cui crura extrorſum diſtorta.

DXLV. LEIOPODES, *Plancus*, *Plautus*.

Cui pedum medium ab interiori parte non eſt cavum, ſed planum.

DXLVI. APELLA.

Cui præputium citra inflammationem ita contractum eſt, ut glandem non tegat.

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.

Cui glans non antice, ſed inferne ſub frenulo perforata.

DXLVIII.

DXLVIII. URORHOEAS.

Cui urina ex urethra in perinæo exeſa effluit.

DXLIX. ATRETA

Cujus anus aut naturalia occluſa.

DL. SANIODES.

Cui thorax tabulæ ritu eſt anguſtus.

DLI. CRIPSORCHIS.

Cujus unus teſtis aut ambo abſconditi.

DLII. HERMAPHRODITUS.

Cui vitioſa naturalium conformatio, ita ut utriuſque ſexus adeſſe videantur.

DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duæ eminentiæ oſſeæ, quaſi cornua, naſcuntur.

DLIV. ARTETISCUS

Qui membri alicujus defectum patitur.

DLV. NEFRENDIS.

Qui dentibus caret.

DLVI. SPANOPOGON.

Qui raram habet barbam, & cui e mento pili excidunt.

DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod ſuperfluum.

DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevius.

DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

DLX. MOLA.

Maſſa carnea, fibroſa, vaſculoſa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec ſilentio prorſus tranſeunda ſunt vitia quædam occulta, quæ non niſi in cadaverum ſectione ſe offerunt,

runte; velut hydrops pericardii, concretiones viſcerum, oſſeſcentiæ cartilaginum, membranarum, muſculorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis & vaſorum, poſitura viſcerum perverſa, bullæ æreæ in venis & pulmonum ſuperficie, aneuriſmata aortæ, anguſtiæ præternaturales vaſorum & ductuum, ipſorumque concretiones.

PARS QUARTA.

SYSTEMA

MORBORUM

SYMPTOMATICUM,

AUCTORE

CLAR. JO: BAPT. MICH. SAGAR,

MED. DOCT. &c. &c.

Viennæ 1776.

CLAVIS CLASSIUM
ET
ORDINUM.

CLASSIS I. VITIA.

Symptomata externa levidenſia, palpabilia, abſque notabili cachexia, pyrexia.

ORDO I. MACULÆ.
II. EFFLORESCENTIÆ.
III. PHYMATA.
IV. EXCRESCENTIÆ.
V. CYSTIDES.
VI. ECTOPIÆ.
VII. DEFORMITATES.

CL. II. PLAGÆ.

Continui ſolutiones, morbi proprie chirurgici perſæpe ſat graves.

ORDO I. SOLUTIONES recentes plerumque cruentæ.
II. SOLUTIONES artificiales recentes cruentæ.
III. SOLUTIONES incruentæ.
IV. SOLUTIONES anomalæ.

CL. III. CACHEXIÆ.

Coloris, figuræ, molis, in corporis habitu ſine notabili febre, depravatio.

ORDO I. MACIES.
II. INTUMESCENTIÆ.
III. HYDROPES PARTIALES.
IV. TUBERA.
V. IMPETIGINES.
VI. ICTERITIÆ.
VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

CL. IV. DOLORES.

Senſationes moleſtæ ad febres non referendæ.

ORDO I. DOLORES VAGI.
II. DOLORES CAPITIS.
III. DOLORES PECTORIS.
IV. DOLORES ABDOMINIS.
V. DOLORES EXTERNARUM.

CL. V. FLUXUS.

Exitus inſolitus cujusvis ſolidi, vel fluidi, e corpore eſt character hujus claſſis.

ORDO I. SANGUIFLUXUS.
II. ALVIFLUXUS ſanguinolenti.
III. ALVIFLUXUS non ſanguinolenti.
IV. SERIFLUXUS.
V. AERIFLUXUS.

CL. VI. SUPPRESSIONES.

Meatuum impeditio, hinc excretionum conſuetarum in ſanitate retentio.

ORDO I. SUPPRESSIONES egerendorum.
II. SUPPRESSIONES ingerendorum.
III. SUPPRESSIONES imi ventris.

CL. VII. SPASMI.

Contractio invita conſtans, vel interpolata muſculorum motum localem efficientium.

ORDO I. SPASMI TONICI PARTIALES.
II. SPASMI TONICI GENERALES.
III. SPASMI CLONICI PARTIALES.
IV. SPASMI CLONICI GENERALES.

CL.

CL. VIII. ANHELATIONES.

Motus ſpaſmodici iterati, defatigantes, pectoris cum reſpiratione ſonora, moleſta, abſque pyrexia notabili.

ORDO I. ANHELATIONES SPASMODICÆ.
II. ANHELATIONES OPPRESSIVÆ.

CL. IX. DEBILITATES.

Impotentia ſentiendi, appetendi, imaginandi, organa artuſque movendi more ad ſanitatem neceſſario.

ORDO I. DYSÆSTHESIÆ.
II. ANEPITHYMIÆ.
III. DYSCINESIÆ.
IV. LEIPOPSYCHIÆ.
V. COMATA.

CL. X. EXANTHEMATA.

Febris cum efflorеſcentia cutis varia maculoſa, puſtuloſa, phlyctænoidea, & aſthenia.

ORDO I. EXANTHEMATA contagioſa.
II. EXANTHEMATA non contagioſa.

CL. X. PHLEGMASIÆ.

Febris cum pulſu duro, dolore topico, inflammatione partis vel externæ, ſanguine miſſo cruſta inflammatoria tecto, urina plus tincta.

ORDO I. PHLEGMASIÆ muſculoſæ.
II. PHLEGMASIÆ membranaceæ.
III. PHLEGMASIÆ parenchymatoſæ

CL. XII. FEBRES.

Frigus, calor, pulſus frequens, reſpiratio aucta, viribus

bus artuum imminutis, depravatis; vel viribus vitalibus pulſu & reſpiratione vix mutatis, virium artuum ſumma proſtratio.

ORDO I. FEBRES CONTINUÆ.
II. FEBRES REMITTENTES.
III. FEBRES INTERMITTENTES.

CL. XIII. VESANIÆ.

Error mentis in imaginatione, appetitu, judicio, aut memoria.

ORDO I. HALLUCINATIONES.
II. MOROSITATES.
III. DELIRIA.
IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

CLAS-

CLASSIS I.

ORDO I. MACULÆ.

Mutationes coloris nativi.

Genus I. LEUCOMA. 1

Macula corneæ pelluciditatem vitians, opacans.

G. II. VITILIGO. 2

Macula corymboſa cum cutis depreſſione, locum fixum non ſervans in quo naſcatur.

G. III. EPHELIS. 3

Maculæ umbrinæ glabræ, corymboſæ, raro partes tectas afficientes, acquiſitæ.

G. IV. NÆVUS. 4

Macula congenita eminens, vel non, ſupra libellam cutis.

G. V. ECCHYMOMA. 5

Eſt macula nigricans, vel atro-rubra, cærulea, liveſcens, in gilvum ſucceſſive deſinens colorem, nata a ſanguine in adipoſam ſub cute effuſo.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Aſpredines, cum cuticulæ elevatione ultra libellam cutis humorales, exiguæ, gregales, abſque pyrexia.

G. VI. PUSTULA. 6

Phyma aut veſicula colorata ſuppurans, diametri linearis, faſtigiata, pure dehiſcens, quandoque in cruſtam abiens; eſt ceu *furunculus* linearis diametri.

G. VII. PAPULA. 7

Phyma parvulum ſeu efflorеſcentia deſquamanda, nec ſuppurans.

8 G. VIII. PHLYCTHÆNA.

Veſicula parva fluido ſeroſo plena, quæ deinde ſponte rumpitur & fundit ſerum.

9 G. IX. BACCHIA.

Maculæ rubræ, vel efflorеſcentiæ naſi & partium adjacentium eidem, guttatæ, plus minus prominentes, aſperæ, furfuraſcentes, diuturnæ; hoc genus ambigit inter maculas & effloreſcentias.

10 G. X. VARUS.

Tumor piſi magnitudine plerumque ſat durus, non ſuppurandus, aut deſquamandus, pertinax in glandulis ſebaceis. L.

11 G. XI. HERPES.

Papularum prurientium corymbus in ſquamas furfuraceas fatiſcentium.

12 G. XII. EPINYCTIS.

Phlycthænarum atro-rubrarum congeries, maxime in tibiis, noctu potiſſimum acriter prurientium.

13 G. XIII. HEMEROPATHOS.

Papulæ rutilæ crura obſidentes, extra lectum illico apparentes, importune prurientes, in lecto evaneſcentes, diuturnæ.

14. G. XIV. PSYDRACIA.

Efloreſcentia eryſipelatoſa abſque febre notabili.

15 G. XV. HYDROA.

Exanthemata granis milii magnitudine & forma ſimilia ſubito exorſa, phlycthænoidea, fugacia; abſque aſthenia, pyrexia, & prægreſſa oppreſſione præcordiorum, miliaria multis habita.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales ſolitarii.

G. XVI. ERYTHEMA. 16

Phyma rubrum calens, diffuſum, ſine febre.

G. XVII. ŒDEMA. 17

Phyma album, frigidum, indolens, molle, foveam ex preſſione ſervans plerumque.

G. XVIII. EMPHYSEMA. 18

Phyma cuti concolor elaſticum, ex preſſione aut percuſſione crepitans.

G. XIX. SCIRRHUS. 19

Phyma durum, indolens, gravans, frigidum, in partibus glanduloſis enatum, dum externum cuti quoque concolor obſervatur.

G. XX. INFLAMMATIO. 20

Eſt tumor ſphæroideus rubore, calore, tenſione, dolore pulſatili inſignis, ſolitarius, plerumque ſat extenſus, in ſuppurationem ſponte vergens; eryſipelas non ſuppurat, & phlegmone habet ſemper pyrexiam conjunctam manifeſtam; inflammatio ſæpius in phlegmone tranſit, vel phlegmone eſt gradus major inflammationis.

G. XXI. BUBO. 21

Phyma ſcirrhoſo-phlegmonoideum in glandulis inguinalibus.

G. XXII. PAROTIS. 22

Tumor ſcirrhoſo-phlegmonoideus parotidis glandulæ, in ſuppurationem lentiſſime vergens.

G. XXIII. FURUNCULUS. 23

Tumor inflammatorius cutaneus, ſeu ſubcutaneus, prominens, profunde ruber, ſphæroideus, cujus centrum occupat vortex fibroſus digeri neſcius; ordinario juglandis habet magnitudinem.

24 G. XXIV. ANTHRAX.

Phyma apice gangrænoſum, & in radio inflammatum.

25 G. XXV. CANCER.

Phyma ſcirrhoſum lancinans, vel phyma lancinans venis varicoſis profunde rubris, nigris, lividis obſitum, cinctum, facile ſanguinantibus.

26 G. XXVI. PARONYCHIA.

Inflammatorius tumor extremi digiti, cum dolore ſæpius perterebrante, calore, tenſione, & ſubinde cum rubore.

27 G. XXVII. PHIMOSIS.

Tumor fere ſemper inflammatorius præputii glandem incarcerans, aut excludens ad coronam hancce vinciendo.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a ſolidis adauctis per ſuccum nutricium copioſiorem advectum, &c. in hoc converſum.

28 G. XXVIII. SARCOMA.

Excreſcentia carnis conſiſtentiam fere habens, plerumque rubra.

29 G. XXIX. CONDYLOMA.

Eſt excreſcentia eminens, vel non eminens, firmior carnibus & cute, mollior contra oſſibus, non elaſtica.

30 G. XXX. VERRUCA.

Excreſcentia cutanea prominens, vix ſenſibilis, indolens, prærupta ſeu aſpera ſuperficie.

31 G. XXXI. PTERYGIUM.

Eſt excreſcentia carnea, vel membranaceo-vaſculoſa ad oculi canthum in globo oculi exorta, alam expanſam utcunque referens, verſuſve corneam ſeſe extendens, creſcens.

G. XXXII. HORDEOLUM. 32

Tumor durus, aut excreſcentia, plus minus mollis, plerumque cuti concolor, ferme ſenſu carens, in limbo palpebrarum enata, magnitudine ſæpius granum hordei vel piſi æquans.

G. XXXIII. TRACHELOPHYMA. 33

Eſt tumor varius, non purulentus, neve inflammatorius, anticæ partis colli.

G. XXXIV. EXOSTOSIS. 34

Tumor oſſis partialis, vel aliquando totius oſſis, ut ſubinde in minoribus fit, ad oſsa accedens.

O. V. CYSTIDES.

Tumores capſulati fluido referti.

G. XXXV. ANEURYSMA. 35

Cyſtis arterioſa cruore referta, ex pulſu & ſitu noſcenda.

G. XXXVI. VARIX. 36

Dilatatio venæ rubra, nigreſcens, ad preſſionem recedens, iterumque ſubito rediens hac ceſsante, plerumque pruriens, mordicans.

G. XXXVII. MARISCA. 37

Tumor in margine ani, ex ſanguine in textum vaſorum minimorum varicoſorum effuſo efformatus, ruber, dolens, variæ formæ & magnitudinis. Vide Hæmorrhoidem. L.

G. XXXVIII. HYDATIS. 38

Cyſtis lymphæductuum dilatatorum, lympham vel ſerum continens.

G. XXXIX. STAPHYLOMA. 39

Cyſtis corneæ, ex dilatatione ejuſdem, ectopia uveæ in cameram oculi anteriorem prolapſæ; hoc genus magis ad Ectopias ſpectat. Vide Caliginem. L.

40 G. XL. LUPIA.

Eſt cyſtis materiem pultis, vel mellis conſiſtentiam referentem continens, haud purulentam, indolens, cuti concolor, loco mobilis.

41 G. XLI. HYDARTHRUS.

Hydrops vel in capſa articulari, vel in cellulis vicinis, haud in tunica propria; tumor eſt fluctuans ſine coloris mutatione, pulſatione.

42 G. XLII. APOSTEMA.

Cyſtis purulenta, vel ichoroſo-purulenta; noſcitur ex fluctuatione, prægreſsa inflammatione, albedine, remiſſione doloris & pulſationis.

43 G. XLIII. EXOMPHALUS.

Cyſtis umbilicalis, fluido quopiam repleta, abſque ectopia.

44 G. XLIV. OSCHEOPHYMA.

Cyſtis ſcroti variis fluidis turgens.

O. VI. ECTOPIÆ.

Partium ſolidarum e ſua ſede dimotio, ſenſibus obvia, continentibus has relaxatis.

45 G. XLV. EXOPHTHALMIA.

Ectopia oculi.

46 G. XLVI. BLEPHAROPTOSIS.

Eſt palpebræ utriuſque, vel alterutrius, morboſa elongatio, retractio, intro vel extra verſio, cum ſymptomatibus cuique ectopiæ propriis.

47 G. XLVII. HYPOSTAPHYLE.

Eſt procidentia ſeu elongatio uvulæ relaxatæ, inflammatæ, ulceratæ, incraſsatæ, attenuatæ, vel bicornis.

48 G. XLVIII. PARAGLOSSA.

Eſt linguæ magnitudo minuta, vel aucta; vel plane ſolutio, aut elongato frenulo, in fauces ejuſdem revolutio.

G. XLIX.

G. XLIX. PROPTOMA. 49

Eſt procidentia appendicum externarum in ſolita & morboſa, diverſa a prædictis.

G. L. EXANIA. 50

Sphincteris ani, vel & inteſtini recti inverſi procidentia extuberans, rubra, reducibilis ſemper extra ſtrangulationem.

G. LI. EXOCYSTIS. 51

Veſicæ inverſa membrana interior, ſoluta a reliquis per urethram foras pendet, & en exocyſtis!

G. LII. HYSTEROPTOSIS. 52

Eſt uteri procidentia tumorem ſiſtens in vagina, vel quandoque extra genitalia pendentem, undique liberum, menſes ſtillantem, ſaltem initio reponibilem cum doloribus hypogaſtrii, inguinum, urinæ difficultate, animi deliquiis; hæc omnia tactus obſtetricius definit.

G. LIII. COLPOPTOSIS 53

Tumor in ſinu muliebri, vel extra pendens, annularis, mollis, perforatus (prolabitur ſubinde una tantum ruga vaginæ) per quod foramen digitus immiſsus altius orificium uteri, uterumque in ſua quaſi ſede abſque colpocele deprehendit, reponibilis; torquet inſuper ægram dyſuria, teneſmus.

G. LIV. GASTROCELE. 54

Eſt tumor in ſcrobiculo cordis vulgo dicto, vel ad minus ſupra umbilicum inſolitus, herniosus, ventriculum, aut alia viſcera illapſa, continens, cuti concolor, reponibilis, in decubitu dorſali ſponte recedens, indolens, ex relaxatione integumentorum undecunque orta natus, vomitum cauſſans.

G. LV. OMPHALOCELE. 55

Tumor hernioſus ad umbilicum, reponibilis, cuti concolor, indolens plerumque, ex relaxatione in-

integumentorum & peritonæi natus, ſvaria viſcera continens.

56 G. LVI. LAPAROCELE.

Tumor hernioſus, ventralis ſeu abdominalis, in quocunque loco abdominis aliis herniis non dicato.

57 G. LVII. MEROCELE.

Tumor herniosſus, in ſuprema & anteriore parte femoris, ad exitum vaſorum cruralium in fœminis præcipue obſervabilis, proprietates herniarum habens; vidi merocelen etiam in viro.

58 G. LVIII. BUBONOCELE.

Tumor herniosſus emergens per annulum vaſorum ſpermaticorum ſenſim, enatus, cuti concolor & indolens, abſente ſtrangulatione.

59 G. LIX. OPODEOCELE.

Eſt tumor herniosſus in ſummo femine adlatus, genitalium egrediens per ſinuoſitatem oſſis iſchii ſuperiorem, vaſis tranſmittendis dicatam; in fœminis prope alterum vulvæ labium viſitur hæc ectopia; reponibilis, cuti concolor, mollis; dum parvus eſt tumor, vix obſervatur, ſubin eſt elaſticus. T. I. Auctorum chirurgicorum Pariſ. p. 709. conſule L.

60 G. LX. ISCHIOCELE.

Eſt hernia emergens per inciſuram oſſis ſacri, ſeu hiatum inter os ſacrum & tuber oſſis iſchii, decubitu prono reponibilis; rarum genus, & ſat adhuc obſcurum.

61 G. LXI. COLPOCELE.

Eſt tumor herniosſus in vagina emergens, reponibilis, in decubitu ſupino natibus elevatis ſponte recedens plerumque, indolens, abſque ſignis aliorum tumorum qui hic enaſci ſolent.

62 G. LXII. PERINÆOCELE.

Tumor herniosſus in perinæo ad unam vel alteram, aut plane utramque, ut vidi in parvula puella,

la, partem, raphes, mollis, reponibilis, cuti concolor; ſubin eſt effectus dyſtociæ; ſpecies hujus generis veſicalis, inteſtinalis, omentalis, patent una cum therapeia ex prioribus.

G. LXIII. PERITONÆORIXIS. 63

Sunt herniæ omnes jam deſcriptæ ob rupturam peritonæi natæ; rixis vero peritonæi ſigna ſunt, crepitus in violentia aliqua majore peritonæum lacerante, herniæ alicujus ſubita & magna protuberantia, eruptio; dolor in loco rixis major aut minor; ſpecies ſunt hujus generis tot, quot genera jam numeravi herniarum. Hernia eſt extenſio præternaturalis peritonæi & integumentorum cavum formans, recipiens viſcera adjacentia; præter prædictas hernias dantur herniarum varietates: Sic dantur herniæ partiales inteſtinales, ubi media pars fiſtulæ inteſtinalis cavum hernioſum ingreditur, altera parte libera in abdomine manente; dantur herniæ accretæ, in quo caſu pars illapſa cavi hernioſi peritonæo accreſcit; cavum hernioſum quandoque præter viſcera illapſa liquorem in abdomine collectum continet; ſæpius quoque partes cavum hernioſum ingreſſæ incarcerantur a ſpaſtice contracto annulo, unde ileus naſcitur, quem vide ſuo loco. Peritonæorixis pertinet quidem ad rupturam; ſed propter affinitatem ejusdem cum herniis, hic eandem ſubjunxi.

G. LXIV. ENCEPHALOCELE. 64

Eſt cerebri, aut cerebelli, vel utriusque ſimul, per hiatus oſſium cranii necdum ſat cohærentium, ectopia hernioſa, relaxata pariter lamina utraque duræ matris & piæ externa tenuiſſima pellucida; ſymptomata ſubin non magna, ſubin contra graviſſima cauſſans.

G. LXV. HYSTEROLOXIA. 65

Eſt uteri gravidi, vel non gravidi, in abdomine ſitus ſeu directio aberrans a directione naturali axeos ſuæ, noſcenda ex orificii uterini directione mutata, palpo externo abdominis, tum aliis

ſymptomatis inconſuetis; ut iſchuria, dyſuria, enureſi, obſtipatione, &c.

66 G. LXVI. PARORCHIDIUM.

Eſt teſticuli unius, vel utriuſque, a ſitu naturali aberratio.

67 G. LXVII. EXARTHREMA.

Eſt ſeparatio contigui in oſſium articulis per diarthroſin combinatorum, noſcenda ex impotentia ad motum, mutatione nativæ conformationis, dolore, protuberantia inſolita, cavitate, muſculorum tenſione, converſione artus, accurtatione membri, vel prolongatione.

68 G. LXVIII. DIASTASIS.

Oſſium receſſus junctorum per raphen, harmoniam, ſynchondroſin, aut ſyndeſmoſin, cognoſcibili cavitate inſolita uno in loco, in altero vero tumore, mutatione poſituræ, & reliquis ſymptomatis oculo & tactui patentibus.

69 G. LXIX. LOXARTHRUS.

Eſt oſſium articulatorum ſitus relativus in alienum conſtanter mutatus, ſeu obliquitas reſpectiva perſiſtens citra exarthrema & ſpaſmum: Vide Subluxationem & Diſtorſionem.

70 G. LXX. GIBBOSITAS.

Eſt oſſium pectus, vel pelvim componentium indecora prominentia a tumore, luxatione, diaſtaſi, torſione, preſſione, aut alio principio nata.

71 G. LXXI. LORDOSIS.

Oſſium longiorum fiſtuloſorum circa medium inflexio, incurvatio ectopia a linea recta.

O. VII. DEFORMITATES.

Sunt vitia quæ vix ſanitatem lædunt.

72 G. LXXII. LAGOSTOMA.

Labium oris fiſſum.

G. LXXIII.

G. LXXIII. APELLA. 73

Eſt præputii, vel alterius appendicis mollis, brevitas, parvitas.

G. LXXIV. POLYMERISMA. 74

Partium ſupra numerum ordinarium exceſſus.

G. LXXV. EPIDOSIS. 75

Appendicum mollium incrementum inconſuetum ſanum. Species ſunt pedes prælongi, auriculæ pendentes, præputia longiſſima; clitoriſmus, caro pubis fœminarum Africanarum, naſones, labia tumida oris; &c.

G. LXXVI. ANCHYLOMERISMA. 76

Eſt partium concretio.

G. LXXVII. HIRSUTIES. 77

Pili copioſiores, longiores; vel in locis ubi non ſolent creſcere obvii, dant ideam hujus generis.

CLASSIS II.

PLAGÆ.

CHAR. CLASSIS. Continui ſolutiones, morbi proprie chirurgici perſæpe ſat graves.

ORDO I. SOLUTIONES.

Recentes, quaſi ſemper cruentæ.

G. I. VULNUS. 78

Eſt continui ſolutio molli in parte hians, labiata, cruenta, ab inſtrumento mechanico ſcindente facta; corneæ vulnus cruorem non fundit.

G. II. PUNCTURA. 79

Continui ſolutio intus extenſa tantum, eaque inſtrumento pungente facta caſualiter.

80 G. III. SCLOPETOPLAGA.

Eſt vulnus a glandibus e bombardis, aut ſclopetis exploſis illatum, vaginatum, decurſum glandis deſignans, oblongum, vexatum.

81 G. IV. MORSUS.

Eſt plaga recens, quam animalia dentibus inferunt mordendo.

82 G. V. EXCORIATIO.

Eſt epidermidis a cute, vel cutis a carnibus ſeparatio, detractio.

83 G. VI. CONTUSIO.

Eſt partis cujuſcunque mollis, vel ſolidæ, in minimis vaſculis, fibris attritio, fractio, ſolutio.

84 G. VII. RUPTURA.

Membranarum, tendinum, aut ligamentorum dialyſis per tenſionem facta, vires horum excedentem. Conſule chirurgos & de utero rupto Cl. Henricum Crantz, ingenii excitatiſſimi virum; huc pertinet peritonæorixis.

O. II. SOLUTIONES.

Recentes, cruentæ, & artificiales.

85 G. VIII. OPERATIO.

Eſt ſtudioſa ſolutio continui ad aliquid eximendum, ut lithotomia; operatio reipſa eſt vulnus ſtudioſa & dextra manu factum chirurgi, morbum relinquens hujus claſſis.

86 G. IX. AMPUTATIO.

Vulnus detruncatione partis totalis factum.

87 G. X. SUTURA.

Eſt, ſtudioſis puncturis mediante acu factis, filiſque per puncturas trajectis, ſolutorum mollium contractio, adductio; ſutura ſicca fit emplaſtris, quæ huc non ſpectat, quum non ſit plaga.

G. XI. PARACENTESIS. 88

Eſt artificialis punctura in aliquod cavum corporis, plerumque acu triquetra cannulata facta.

O. III. SOLUTIONES

Incruentæ, nec ad priores referendæ, pus, ſaniem, cariem, &c. ſiſtentes.

G. XII. ULCUS. 89

Eſt vulnus ſuppuratum partis mollis, vel ſolutio continui mollis antiqua, pus, ichorem, aut ſaniem quamcunque alens, fundens.

G. XIII. EXULCERATIO. 90

Ex excoriatio ſuppurans, ſeu ulcus ſuperficiale: reliqua, quæ ad hoc genus ſpectare videntur, ex ulcere patent.

G. XIV. FISTULA. 91

Eſt ulcus cortice calloſo vaginatum, ore anguſtatum, oblongum.

G. XV. SINUS. 92

Eſt cavitas ulceroſa ampla, ſæpe multiplex, ore anguſto non calloſo, vel plane nullo donata.

G. XVI. ESCHARA. 93

Cruſta mortua ſicca partis mollis ſæpius cauſticis facta eſt eſchara, ſenſus & vitæ expers.

G. XVII. CARIES. 94

Oſſis eroſio cava, aſpera, perioſtio denudata, plerumque nigra; unde os evadit fragile, friabile, vel exfoliabile. Species numerat hoc genus ſequentes; eſt nimirum caries ſicca, humida, exfoliabilis, ſyphilitica, ſcorbutica, ſcrophuloſa, variolosa.

G. XVIII. ARTHROCACE. 95

Ulcus medullæ ab interioribus ſponte natum, cum oſſis carie, exoſtoſi, & perſæpe dolore; ſpecies numerat hoc genus fere totidem quot caries; vulgo vocatur ſpina ventoſa: Conſule ſuper hac Petit de morbis oſſium.

O. IV.

O. IV. SOLUTIONES

Anomalæ, quæ prioribus includi renuunt.

96 G. XIX. RHAGAS.

Eſt ſolutio continui ſicca in partium mollium marginibus, ut labiis oris; ſpecies includit Rhagas veneream, malignam, peſtiferam, frambæſiacam ulceroſam, benignam, lixivialem, glacialem, &c.

97 G. XX. AMBUSTIO.

Eſt plaga a flamma ignis, corporibuſque ex igne candentibus, liquidis ferventibus, aut radiis ſolis in focum coactis, noſtro corpori illata ſuccedentibus phænigmo, phlycthænis, vel eſchara.

98 G. XXI. FRACTURA.

Eſt diviſio oſſium in fragmenta ſeparabilia.

99 G. XXII. FISSURA.

Diviſio oſſium rimam referens, hæcve non penitus ſeparans.

CLAS-

CLASSIS III.

O. I. MACIES.

Diminutio voluminis corporis ex conſumptione pinguedinis, vel ſanguinis defectu.

G. I. TABES. 100

Eſt macilentia univerſalis, cum pyrexia lenta & habituali, citra tuſſim puriſve anacatharſin.

G. II. PHTHISIS. 101

Corporis emaciatio, cum amphimerina lenta, tuſſi, dyſpnœa, & ut plurimum puris ſputo. Ab initio rarius in phthiſi adeſt puris ſputum, in Statu contra & fine ſemper. Quid eſt proprie pus?

G. III. ATROPHIA. 102

Eſt macies ſine tuſſi, anacatharſi, & febre notabili; raro equidem eſt atrophia ſine omni febricula. Conſule definitionem febris.

G. IV. HÆMATAPHORIA. 103

Macies ſeu cachexia ex inopia ſanguinis. Deſcriptio: Virium debilitas, pertinax aurium ſibilus, anorexia, facies lurida, epidelio tecta, pallidiſſima alvi fluxus, diabetes, ſudores profuſi, lipothymiæ, tibiæ tumidæ, ſubin hydrothorax his ſuccedens, vigiliæ, ſuſpiria, animi abjectio, mœror, mortis timor, urina pallida, venæ abditæ, pulſus vacuus, ſanguinis profluvia prægreſſa, ſunt ſigna hæmataphoriæ; aliquando aer evolutus locum ſanguinis in vaſis occupat.

G. V. ARIDURA. 104

Macies, exſiccatio unius tantum artus, vel partis corporis, ſine febre.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas ex volumine, mole, auctis.

105 G. VI. PLETHORA.

Intumeſcentia univerſalis, proportionata & æquabilis, ex abundantia ſanguinis. Deſcriptio: Amyſtidis & ventris cultus, puiſus plenus aut ſuppreſſus, venarum amplitudo conſpicua: Æſtus & gravitas totius corporis, reſpirandi difficultas, laſſitudo ſpontanea, ſtupor artuum, ſomni turbati, partes epidelio tectæ ruberrimæ, temperamentum ſubaxum, ſanguineum.

106 G. VII. POLYSARCIA.

Intumeſcentia univerſalis, mollis, pallidula, ab adipe nimium aucto.

107. G. VIII. PNEUMATOSIS.

Intumeſcentia univerſalis ab aere, ad attactum crepitans, elaſtica, levis.

108 G. IX. ANASARCA.

Intumeſcentia univerſalis œdematoſa, non elaſtica, veſtigium digiti impreſſi ſervans, pallida, frigida, haud crepitans.

109. G. X. PHLEGMATIA.

Intumeſcentia œdematoſa artuum inferiorum mollis, cuti concolor, indolens, foveam digiti impreſſi ſervans, non elaſtica.

110. G. XI. PHYSCONIA.

Eſt intumeſcentia abdominis a partibus ſolidis præternaturalis, ſine graviditate, fluctuatione, & elaſi, ad tactum dura, reſiſtens, parenchymatica.

111 G. XII. GRAVIDITAS.

Intumeſcentia abdominis ex imo hypogaſtrio incipiens, in axique ejuſdem aſcendens, opus generationis ſubſequens, partu terminanda; pathemata gravidarum, motus infantis ſenſibilis, ſunt totidem characteres hujus generis.

O. III.

O. III. HYDROPES PARTIALES.

Tumores a fluidis in cavitatibus congeſtis, ut abdomine, &c.

G. XIII. HYDROCEPHALUS. 112

Hydrops capitis a ſero.

G. XIV. PHYSOCEPHALUS. 113

Eſt tumor totius capitis emphyſematoſus elaſticus, ſub digito crepitans.

G. XV. HYDRORACHITIS. 114

Tumor cyſticus ex hiatu vertebrarum lumbarium, vulgo ſpina bifida, in recens natis protuberans cum anæſtheſia; eſt verus hyprops thecæ ſpinalis. A.

G. XVI. ASCITES. 115

Gravis, ſphæroidea, & fluctuoſa abdominis intumeſcentia, non elaſtica, cum polydiſia, urina pauca, lixiviali, lateritia.

G. XVII. HYDROMETRA. 116

Tumor hypogaſtrii ſine graviditate, ab utero fluidis diſtento, rotundus, fluctuans, leges gravitatis ſequens; dolor inguinum, ſpirandi difficultas, menoſtaſia, rigores, mammarum mollities, phlegmatia, & tactus orificii uterini, diagnoſin firmant.

G. XVIII. PHYSOMETRA. 117

Eſt conſtans tumor hypogaſtrii a flatu uterum diſtendente, rotundus, elaſticus, levis, in ſede uteri.

G. XIX. TYMPANITES. 118

Eſt intumeſcentia totius abdominis, levis & elaſtica, a pulſatione ſonum edens, cum ructibus, borborygmis, conſtipatione, & doloribus abdomini; chronicus eſt hic morbus.

119 G. XX. METEORISMUS.

Eſt intumeſcentia flatulenta epigaſtrii, hypochondriorum, vel totius abdominis, fugax & plerumque indolens.

O. IV. TUBERA.

Tumores partium ſolidarum externi, non hydropici, cachexia.

120 G. XXI. RACHITIS.

Eſt deformitas nata ex articulorum tumore duro, carnium marcore & flacciditate, capitis mole, ſterni protuberantia; ingenium præcox in infantibus, oſſiumve flexilitas & lordoſis.

121 G. XXII. SCROPHULA.

Tumores ſubſcirrhoſi glandularum colli, meſenteriive, cum labiis naſoque craſſioribus; ſcrophula ordinario mollior eſt ſcirrho.

122 G. XXIII. CARCINOMA.

Ulcera cancroſa, ſordida, labiis duris everſis, ſcirrhoſis, ex quibus ichor manat acris & rodens; adſunt inſuper dolores lacinantes, excreſcentiæ fungoſæ, venæ adjacentes varicoſæ non inepte pedes cancri referentes, & febris hectica.

123 G. XXIV. LEONTIASIS.

Cognoſcitur ex mutatione formæ humanæ in ferinam aliquatenus; unde aſpectus hominis ferinus.

124 G. XXV. MALIS.

Morbus eſt, qui cognoſcitur tumoribus. ulceribus, quæ inſecta vermiformia vel horum larvæ excitarunt, in quibus nidulantur, & ex apertis prodeunt.

125 G. XXVI. FRAMBÆSIA.

Morbus contagioſus, aliquando & congenitus apud Americanos, cujus præcipuum ſymptoma ſunt excreſcentiæ fungoſæ mori fructus referentes, qui-

quibus ſeſe adjungunt ulcera dyſepulota, exoſtoſes, caries, anchyloſes, & macies.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi contagioſi, chronici, qui cutis excreſcentias, tumores gregales, exulcerationes, cruſtas, inducunt, plures foventur a viru inoculabili.

G. XXVII. SYPHILIS. 126

Ulcuſcula, porri, ficus, bubones, tophi, nodi, poſt vel cum gonorrhœa plerumque; dein puſtulæ cruſtoſæ, dolores nocturni, oſtocopi, exoſtoſes, caries, macies, & color luridus, morbum adeſſe loquuntur.

G. XXVIII. SCORBUTUS. 127

Cognoſcitur ex maculis lividis, flavis, cœruleis tibiarum, ſtomacace, facie lurida, urina pellicula tecta.

G. XXIX. ELEPHANTIASIS. 128

Facies deformis, tubera calloſa, ozæna, raucedo, cutis elephantina craſſa & unctuoſa, rictus ſatyrorum, anæſtheſia in artubus, conſtituunt characterem hujus generis.

G. XXX. LEPRA. 129

Cognoſcitur ex puſtulis verrucoſis, duris, craſſis, herpetoſis, vel ſquamis ſiccis in corymbos diſpoſitis, prurientibus, eſcharoticis, rhagadibus; dum plures ſunt ſiccæ puſtulæ, *ſicca*; ubi vero, e contra, plures humidæ & exulceratæ, *humida* dicitur lepra.

G. XXXI. SCABIES. 130

Cognoſcitur ex puſtulis, vel phlycthænis, lentis vel ſecalis grani magnitudine, lympham aut ſaniem continentibus, quæ ſcalpendo ruptæ cruſtas prurientes formant: contagioſus hic morbus & inoculabilis flexuras artuum maxime occupat.

G. XXXII. TINEA. 131

Incipit a puſtulis vel phlycthænis capitis aut faciei

diverſi-coloribus, quæ ruptæ in cruſtas humidas vel ſiccas abeunt corymboſæ; videtur nimirum eſſe ſcabies capitis, & nihil aliud.

O. VI. ICTERITIÆ.

Cognoſcuntur ex totius cutis colore inaſſueto, pallido, flavo, nigro, rubro, lurido ſine pyrexia notabili.

132 G. XXXIII. AURIGO.

Flavedo cutis ad aureum, vel aurantium tendens colorem, præcipue vero ſceleroticæ membranæ.

133 G. XXXIV. MELASICTERUS.

Color cutis & ſceleroticæ niger, atro-lividus, fuliginoſus, conſtituunt characterem hujus generis, cum mœſtitia & perturbatione mentis.

134 G. XXXV. PHOENIGMUS.

Morbus hicce apyretus rubedine cutis diffuſa maculata, vel punctata, notatur.

135 G. XXXVI. CHLOROSIS.

Pallor faciei totiuſve corporis cum aſthænia, & ſæpius pica, ſine aurigine ſcleroticæ; color eſt albus, cinereus, fuſcus, cereus, luridus, aut vireſcens, cum ſclerotica ſemper albiſſima perſeverante.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Noſcuntur ex ſignis claſſeos & affinitate cum prioribus generibus.

136 G. XXXVII. PHTHIRIASIS.

Exortus inſectorum, pediculorum, aut his affinium, cum porrigine, exulceratione, pruritu, cachexia.

137 G. XXXVIII. TRICHOMA.

Morbus contagioſus Hebræorum, cujus præcipuum ſym-

ſymptoma eſt capillorum conſpurcatio, complicatio, conglutinatio, & in cirros ac funiculos concretio inextricabilis, ſæpius cum phthiraſi; hæreditarius eſt morbus hicce.

G. XXXIX. ALOPECIA. 138

Defluvium pilorum & deſquamatio cuticulæ conſtituunt characterem hujus morbi, cunctis animantibus communis.

G. XL. ELCOSIS. 139

Copioſa ampla ulcera, fœtida, carioſa, chronica, cum pyrexia lenta, produnt hoc genus.

G. XLI. GANGRÆNA. 140

Anæſtheſia, immobilitas, frigus, phlyctænæ lympham continentes, flacciditas, lividitas, & partis mors in cute & membrana celluloſa, vel in omnibus ad oſſa uſque, textus facilis laceratio & diſſolutio putrida, cum fœtore cadaveroſo; definiunt hoc genus.

G. XLII. NECROSIS. 141

Eſt partis mors lenta ſine prævio tumore, mollitie, & diſſolutione fœtida, cum dolore ardente ordinario & ſtupore, quæ ſequitur exſiccatio partis, induratio, nigredo, & mumia; differt a gangræna in eo, quod lentius procedat, cum dolore rodente & ſtupore, & in mumiam abeat; gangræna contra molleſcat, phlyctænas elevet, putreſcat, fœteat, atque cito decurrat.

CLASSIS. IV.

Ingrata & moleſta ſenſatio, aut imaginatio, qualis ex nervearum partium laceratione, roſione, uſtione, preſſione, diſtractione, oritur, reliqua ſymptomata ſuperans hanc definit claſſem.

O. I. DOLORES VAGI.

Sæpius univerſales, aut cutanei ad phlegmaſias non referendi.

142 G. I. ARTHRITIS.

Articulorum dolor ſpontaneus, periodicus a ſynovia corrupta.

143 G. II. OSTOCOPUS.

Eſt dolor conſtans & notabilis oſſium, a perioſtio interno potiſſimum affecto, ex preſſione non exacerbans, fixus.

144 G. III. RHEUMATISMUS.

Dolor diuturnus in parte carnoſa, tendinoſa artuum, vagabundus, ſæpius ſine coryza, rheumate, catarrho, eryſipelate. & ſine febre notabili; acutus rheumatiſmus facit genus inter phlegmaſias *Myoſitin* a me dictum; ſanguis miſſus rheumatiſmo laborantium eſt gelatinoſa cruſta tectus, & urina ſæpe ad ſulphureum colorem accedit.

145 G. IV. CATARRHUS.

Colli collove vicinarum partium dolor a frigore ſuſcepto, cum tuſſi, coryza, levi partium intumeſcentia, & pyrexia veſpertina exigua, ſeu amphimerina catarrhali.

146 G. V. ANXIETAS.

Moleſtia ad loci mutationem aſſiduam cogens ægrum, quem habet.

147 G. VI. LASSITUDO.

Eſt ingrata ſenſatio, juncta cum debilitate, quæ ad quietem cogit virium reparandarum gratia.

G. VII.

G. VII. STUPOR. 148

Eſt moleſta ſenſatio cum obſcuritate tactus.

G. VIII. PRURITUS. 149

Moleſta ſenſatio ad ſcalpendum cogens.

G. IX. ALGOR. 150

Moleſta qualis a ſummo aeris frigore excitatur, jam cum phricaſmo, rigore, vel concuſſione corporis, jam ſine his ſymptomatibus.

G. X. ARDOR. 151

Moleſtia qualis a ſummo aeris calore producitur.

O. II. DOLORES CAPITIS,

Faciei, vel Capillitii.

G. XI. CEPHALALGIA. 152

Eſt capitis gravitas vel ſenſatio moleſta, quæ refert caput interius diſtenſum, turgidum, & quaſi gravatum, malum haud chronicum.

G. XII. CEPHALÆA. 153

Eſt dolor capitis chronicus, &, juxta Sthalianos, tenſivus; videtur ſola diuturnitate a cephalalgia differre receptiſſimum hoc genus.

G. XIII. HEMICRANIA. 154

Eſt morbus, cujus præcipuum ſymptoma eſt dolor in alterutro capitis latere, potiſſimum ad tempora, frontem, ac oculos, iſque vehemens ſæpe & periodicus quandoque.

G. XIV. OPHTHALMIA. 155

Cognoſcitur ex oculi dolore, rubore, intolerantia lucis, & lacrymatione, vel ſiccitate.

G. XV. OTALGIA. 156

Dolor in aure.

157 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor dentium maxillarumque, cum vigiliis &

ſæpius ptyaliſmo, maxillæ aut genarum tumore.

O. III. DOLORES PECTORIS

Anhelationis expertes.

158 G. XVII. PYROSIS.

Ardor œſophagi ad ventriculum uſque extenſus, ſine febre, vulgo Soda dicitur.

159 G. XVIII. CARDIOGMUS.

Eſt gravis pertinaxque moleſtia in præcordiis, cum ſenſu ponderis auctæve molis & pulſatione, quæ ad minimum motum augentur: Aneuryſmati cordis, auricularum, ſinuum, & arteriarum tribuitur cardiogmus, ſeu dolor cordis.

O. IV. DOLORES ABDOMINIS

Interni.

160 G. XIX. CARDIALGIA.

Moleſtia ad epigaſtrium & ventriculum relata, ſyncopen minitans.

161 G. XX. GASTRODYNIA.

Notabilis & durans in regione ventriculi dolor, ſine ſyncope & pyrexia.

162 G. XXI. COLICA.

Eſt dolor potiſſimum inteſtini craſſi regiones occupans in abdomine, hujuſque officia turbans, ſine febre notabili, cum pulſu plerumque ſuppreſſo, rariore, & obſtipatione.

163 G. XXII. HEPATALGIA.

Moleſta ſenſatio gravativa, tenſiva, aut quævis alia in regione hepatis, ſine pyrexia acuta.

164 G. XXIII. SPLENALGIA.

Eſt dolor pertinax gravativus, tenſivus, in regione

ne lienis, cum aliquali dyſpnœa, pulſu in inſpiratione intermittente, tumore & duritie, ſine pyrexia.

G. XXIV. NEPGRALGIA. 165

Dolor fixus in regione renum & ureterum, ſine pyrexia acuta.

G. XXV. HYSTERALGIA. 166

Dolor in regione uteri, ſine parturitionis niſu & phlegmaſia notabili.

O. V. DOLORES EXTERNARUM

Partium locales.

G. XXVI. MASTODYNIA. 167

Dolor mammarum.

168 G. XXVI. RACHIALGIA.

Atroces dolores abdominis, ad lumbos & dorſum ſerpentes, preſſione non creſcentes, cum umbilici ſubin retractione, alvi conſtipatione, convulſione, manuum torpore, pareſi, paralyſi, ac contracturis artuum, definiunt hunc morbum.

169 G. XXVIII. LUMBAGO.

Eſt dolor lumborum corporis erectionem impediens, ſine nauſea, ureterum dolore, femoris ſtupore, urinæve vitiis; dolor eſt in muſculis ſpinæ dorſi aut ligamentis,

G. XXIX. ISCHIAS. 170

Dolor conſtans coxendicis, pelvis, & capitis femoris, nec non muſculorum ejuſdem, hinc difficultas gradiendi, ſtandi, claudicatio, frigus partis; conatus ad deponendam alvum dolorem augent iſchiadicum.

G. XXX. PROCTALGIA. 171

Eſt dolor podicis.

G. XXXI. PUDENDAGRA. 172

Dolor partium genitalium tum in viris, tum in fœminis.

173 G. XXXII. DIGITIUM.

Eſt dolor periodicus articuli cujuſdam digiti, cum emaciatione & oſſis friabilitate, ſine omni phlegmaſia. Vide Ill. De Sauvageſ. T. I. p. 150.

CLASSIS V.

FLUXUS.

Char. Classis. Exitus inſolitus cujuſvis fluidi vel ſolidi e corpore.

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis, vel ſaltem ſanguinolentæ materiæ ejectio ſeu effluxus, quacunque via, præter alvinam.

174 G. I. HÆMORRHAGIA.

Eſt fluxus ſanguinis e naribus.

175 G. II. HÆMOPTYSIS.

Eſt ſanguinis expectoratio ſeu anacatharſis, cum tuſſi ſine notabili pyrexia.

176 G. III. STOMACACE.

Stomacace laborantibus ſanguis diſſolutus promanat e gingivis laxis, ſordidis, & fœtidis, ſponte, vel ad levem harum attactum.

177 G. IV. HÆMATEMESIS.

Eſt ſanguinis rejectio ex œſophago, cum vomitorio conatu, anxietate magna, & animi deliquiis; obſervantur & fæces alvi ſanguine tinctæ, nigricantes.

178 G. V. HÆMATURIA.

Eſt effluxus ſeu minctio cruoris, urinæ cruentæ ex veſica, vel ſeminis ſanguinolenti ex urethra, in viris, & mulieribus.

G. VI.

G. VI. METRORRHACIA. 179

Sanguinis ex utero aut vagina fluxus morboſus, nimius.

G. VII. A B O R T U S. 180

Eſt fœtus immaturi, id eſt ante nonum menſem graviditatis ſaltem aliquot ſeptimanis excluſio, ſubin cum metrorrhagia. Symptomata ſunt, laſſitudo, anorexia, frigus, mammarum flacciditas, lumbago, hyſteralgia, lipothymia, &c.

O. II. ALVIFLUXUS

Sanguinolenti.

G. VIII. HEPATIRRHŒA. 181

Eſt alvi fluxus per inferiora ſanguinolentus, nec ater, nec torminoſus.

G. IX. HÆMORRHOIS. 182

Eſt ſanguifluxus ex tuberculis, mariſcis rubris, duris, dolorificis, finem inteſtini recti obſidentibus, vel in recto latentibus; ſentiunt poſteriora tubercula ægri in recto ſæpius obſtipari, & digitus immiſſus inteſtino hæc offendit; ſanguis in depoſitione alvi præcedit, vel ad minus comitatur, excrementa.

G. X. DYSENTERIA. 183

Eſt frequens torminoſa mucoſo-cruenta alvi dejectio.

G. XI. M E L Æ N A. 184

Eſt fluxus materiei nigricantis, atro-rubræ, ano vel cato frequens.

O. III. ALVIFLUXUS

Non ſanguinolenti.

185 G. XII. NAUSEA.

Eſt inanis vomendi conatus, & tamen maximis licet niſibus nihil niſi flatus aut mucus exiguus exantlatur; adeſt anorexia, gaſtrodynia, motus oſſis hyoidis ad ſuperiora, ptyaliſmus; capitis ad anteriora inclinatio, tremor labii inferioris, &c.

186 G. XIII. VOMITUS.

Eſt palpabilium materierum non cruentarum per os œſophagumque rejectio frequens ex ventriculo; cauſa eſt antiperiſtaltica ventriculi contractio, concurrente diaphragmatis & muſculorum abdominalium preſſione, cum ſimultanea expiratione; pulſus eſt contractus, rigidus, & frequens.

187 G. XIV. ILEUS.

Gaſtrodynia, obſtipatio, anxietas, & vomitus demum fæculentæ materiæ, determinant hunc morbum; atrocia circa umbilicum tormina, ructus, nauſea, ſingultus, inteſtinorum volutatio, virium proſtratio, pertinax alvi obſtipatio & vomitus demum fæculentus, ſunt ſymptomata principalia hujus morbi.

188 G. XV. CHOLERA.

Eſt ſyndrome ex vomitu, diarrhœa, gaſtrodynia, proſtratione virium, & ſubin ſurarum crampo.

189 G. XVI. DIARRHOEA.

Eſt recrementorum & excrementorum ut plurimum fluxilium frequens per anum dejectio notabilis & conſtans, adeoque morboſa.

190 G. XVII. COELIACA.

Eſt albeſcentium, aut chyliacearum materierum per alvum frequens dejectio, plerumque profuſa cum torminibus & proſtratione virium.

G. XVIII.

G. XVIII. LIENTERIA. 191

Alimenta parum aut nihil mutata per alvum dejiciunt, & quidem plerumque paulo poſt ingeſtionem, lienterici.

G. XIX. TENESMUS. 192

Muci frequens & pauca dejectio per anum, cum intenſa dejiciendi cupiditate, conatuque eidem proportionali; ſtimulum & dolorem ſentiunt ægri inteſtino recto.

G. XX. PROCTORRHŒA. 193

Eſt fluxus mucoſi ſubalbi, flaveſcentis, quandoque ſtriis ſanguineis tincti, humoris ex vaſis hæmorrhoidalibus externis, vel in recto latitantibus, qui humor ordinario ſpiſſior eſt, dum ex internis vaſis ſtillat, ſcybalaque præcedit: Vide Lieutaud T. 1. p. 396. N. 4. Pruritum præterea & ardorem hoc fluxore madentes & fœtentes in podice ſentiunt, queruntur. Species non adeo magni momenti in praxi poſſunt eſſe proctorrhœa externa, interna, periodica ſanguinolenta, hujus generis, quod etiam proctoleucorrhœa vocari poteſt, ob ſimilitudinem cum leucorrhœa.

O. IV. SERIFLUXUS.

Fluidi nec ſanguinolenti, nec per alvum, effluxus morboſi.

G. XXI. EPHIDROSIS. 194

Eſt ſudoris quantitate, qualitate, aut intempeſtivitate peccantis, excedentis affluxus.

G. XXII. EPIPHORA. 195

Eſt oculis conſtans effluxus humoris ſeroſi, lacrymalis, ſebacei, aut purulenti, morboſus.

196 G. XXIII. CORYZA.

Eſt humoris ſeroſi muſcoſive e naribus fluxus morboſus, ſine, vel cum ozæna, concomitante plerumque gravedine capitis.

197 G.

197 G. XXIV. PTYALISMUS.

Eſt ſalivæ mucive, ſine anacatharſi ac vomitione ex ore effluxus, emiſſio, aut ſputatio uber & conſtans.

198 G. XXV. ANACATHARSIS.

Eſt muci, lymphæ, aut puris facta cum tuſſi e pectore per os rejectio frequens, notabilis, & morboſa.

199 G. XXVI. DIABETES.

Subita potus omnis per urinæ vias emiſſio, vel urinarum utcunque coctarum nimia profuſio, cum ſiti, anorexia, & polydipſia.

200 G. XXVII. ENURESIS.

Involuntaria & inopportuna doloris & ardoris expers minctio, quæque ſæpius inſciis accidit.

201 G. XXVIII. PYURIA.

Eſt purulentæ, albæ, flavæ, mucoſæ, aut lutulentæ materiæ cum urinis minctio.

202 G. XXIX. LEUCORRHOEA.

Eſt ſeroſæ, flavæ, puriformis, mucoſæ, fœtidæ, atræ, &c. materiæ ex utero aut vagina delapſus, effluxuſve morboſus..

203 G. XXX. LOCHIORRHOEA.

Eſt lochiorum alborum nimius fluxus puerperam debilitans.

204 G. XXXI. GONORROEA.

Eſt ſtillicidium fluidi ſeminalis, vel puriformis, ex urethra, ſine minctione.

205 G. XXXII. GALACTIRROEA.

Eſt ſtillicidium lactis e mammis, vel locis inſolitis.

G. XXXIII.

G. XXXIII. OTORRHOEA. 206

Eſt fluxus ſeroſus, purulentus, fœtidus, ex cavo auris, meatu auditorio, vel ambitu auriculæ.

O. V. AERIFLUXUS

Sunt flatus halituſve inſolitæ & vitioſæ emiſſiones per os vel anum, &c.

G. XXXIV. FLATULENTIA. 207

Eſt morbus flatuum per os, vel anum, frequenti emiſſione & borborygmis deſignatus.

G. XXXV. ÆDOPSOPHIA. 208

Eſt flatuum ex veſica per urethram, vel ex utero per vaginam, emiſſio.

G. XXXVI. DYSODIA. 209

Eſt fœtidorum vaporum e corpore exhalatio odoratum offendens, exhalante tales vapores e naribus, ore, vulva, inguinibus, axillis, & pedibus.

CLASSIS VI.

CHAR. CLASSIS. Meatuum impeditio; hinc ſolitarum in ſanitate excretionum impedimentum & emanſio; *Suppreſſorios* morbos vocavit Ill. Linnæus.

ORDO I. SUPPRESSIONES

Humorum ſeroſorum.

210 G. I. ADIAPNEUSTIA.

Tranſpirationis naturalis, & liquoris cutis organa humectantis, ſuppreſſio.

211 G. II. STERILITAS.

Eſt geniture ſuppreſſio, conceptus impeditio.

212 G. III. ISCHURIA.

Urinæ ſecretæ a renibus retentio ſeu ſuppreſſio; cum tumore hypogaſtrii, vel ſecretionis in renibus ſuppreſſio, cum ſtupore renum, ſingultu, anorexia, vomitu, ptyaliſmo urinoſo, ephridroſi.

213 G. IV. DYSURIA.

Difficilis & dolorifica, guttata ſæpius & ardens mictio; eſt ergo fluxus urinæ pro parte ſuppreſſus, & non in integrum, ut in iſchuria.

214 G. V. AGLACTATIO.

Lactis defectus.

215 G. XI. DYSLOCHIA.

Eſt lochiorum ſuppreſſio.

O. II.

O. II. SUPPRESSIONES INGERENDORUM,

Conſtrictio meatuum ingerenda admittentium, ſine phlegmaſiâ.

G. VII. DYSPHAGIA. 216

Eſt deglutitionis ſuppreſſio, impeditio, abſque notabili reſpirationis læſione & phlegmaſia.

G. VIII. ANGINA. 217

Eſt reſpiratio impedita, cum ſenſu obicis in gutture, abſque phlegmaſia; ſive dein adſit dyſphagia, ſive non.

O. III. SUPPRESSIONES

Imi ventris.

G. IX. DYSMENORRHOEA. 218

Menſtrua ſuppreſſa, dolorifica, cum lumbagine, cephalalgia, dyſpnœa, palpitatione cordis, &c. conſtituunt characterem hujus generis; fluxus menſtruus periodicus a tribus ad 8 dies protelari ſolet; quantitas ſanguinis a quinque ad 10 uncias limitatur, circa 13 annum ætatis incipit, & ad 45 plerumque producitur; ſanguis refert ſanguinem victimæ.

G. X. DYSTOCIA. 219

Dolorifica, laborioſa ultra modum fœtus excluſio aut ſecundinarum, vel penitus impoſſibilis.

G. XI. DYSHÆMORRHOIS. 220

Eſt ſuppreſſio ſuetarum hæmorrhoidum; dum fluxus hæmorrhoidum ſuetarum periodicus ſæpius ſupprimitur, ex quacunque occaſione, ante annum circiter 60, 65, quo hic fons ſponte ſiccari ſolet; oriuntur lumbago, iſchias, vertigo,

cepha-

cephalalgia, tenſio cervicis, anxietas, dyſpnœa, colica, &c. Hæmorrhoidum fluxus, qui ultra 65. annum ætatis protelatur, jam morboſus haberi debet & ſupprimi minuive; ſenectus enim hunc fluxum non fert. Hæmorrhois rariſsime cum conſtantia ſanitatis obſervatur; hinc vix pro beneficio haberi poteſt, licet morbos graviores prævertere dicatur.

221 G. XII. OBSTIPATIO.

Fæcum alvi exoneratio impedita. Carolus *Linnæus*; eſt nimirum ſegnis, difficilis, rara fæcum alvi excretio, vel plane nulla etiam medicamentis prolici poſſunt excrementa: Medici aſsiduo curant obſtipationem, & tamen hanc nec in numero morborum tolerant, equidem raro eſt morbus per ſe, ſæpiſsime vero ſymptoma hoc alios morbos comitatur & auget.

CLASSIS VII.

SPASMI.

Char. Classis. Contractio conſtans, vel interpolata, muſculorum motum localem efficientium, eaque invita.

O. I. SPASMI TONICI PARTIALES.

Rigiditas organi, vel artus determinati.

222 G. I. STRABISMUS.

Oculi alterutrius ſpaſmus, tonicus axium opticorum divergentiam, vel convergentiam nimiam inferens, ſeu eſt ſpaſmus tonicus oculi, unde hujus axis cum alterius axi ad unicum objectum non convergit.

G. II.

G. II. TRISMUS. 223

Eſt ſpaſtica contractio tonica, aliquando viſa fuit ſolum clonica maxillæ inferioris, vulgo *trotura oris* dicitur; ruſticus venerat ad me pedes triſmo tonico laborans, pro conſilio contra hunc morbum: datur igitur ſolitarius hicce morbus; vide *tetanum*.

G. III. OBSTIPITAS. 224

Eſt colli ſpaſmus, vulgo dicitur *torticollis*, tonicus, vel clonicus capitis mobilitatem & directionem mutans.

G. IV. CONTRACTURA. 225

Eſt artus unius vel plurium conſtans, diuturna rigiditas, inflexilitas.

G. V. CRAMPUS. 226

Eſt ſubitanea, fugax, & dolorifica muſculi rigiditas, cum dolore ſubin atroci.

G. VI. PRIAPISMUS. 227

Eſt penis ingrata & ſine appetitu libidinis rigiditas, ſeu erectio.

O. II. SPASMI TONICI GENERALES.

228 G. VII. TETANUS.

Spaſmus generalis tonicus ſubito ortus, cum dyſpnœa; rigent musculi omnes, & corpus inflexile ſervant, cum dyſpnœa & rubore faciei; vel rigent muſculi ſoli poſteriores corporis, aut anteriores, & corpus flectunt horribiliter, & plerumque flexum ſervant diutius.

G. VIII. CATOCHUS. 229

Spaſmus generalis tonicus ſenſim factus, ſine dyſpnœa, agitatione pectoris, faciei rubore, chronicus.

O. III. SPASMI CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita & coacta cujusdem organi aut artus, cujus motivum ab ægro non percipitur.

230 G. IX. NYSTAGMUS.

Spaſmus clonicus oculi, vel palpebræ.

231 G. X. CARPHOLOGIA.

Eſt ſpaſmus clonicus manuum, quo ægri floccos e tegumentis evellunt, paleas colligunt, muſcas venantur, ſymptoma hoc a ſuffuſione natum plerumque eſt lethale.

232 G. XI. SUBSULTUS.

Eſt motus palpitans aut tremulus tendinum, pone carpos potiſſimum obſervabilis.

233 G. XII. PANDICULATIO.

Eſt ſpaſmus artus ſucceſſive extendens plures, vel omnes in oſcitatione.

234 G. XIII. APOMYTTOSIS.

Eſt ſuccuſſio cutis & capitis, cum trunci totius agitatione tremula & violenta: adeſt ſimul exſpiratio ſonora, quaſi ſtertoroſa.

235 G. XIV. CONVULSIO.

Eſt agitatio invita artus, vel muſculi brevis cum ſuperſtite exercitio animi.

236 G. XV. TREMOR.

Artuum aut capitis alterna, per itus & reditus frequentes, motitatio per breviſſima ſpatiola, cum movendi voluntate concurrens, qua ceſſante, ceſſat quoque tremor.

237 G. XVI. PALPITATIO.

Eſt pulſatio in regione cordis inſolita, cum pulſu intermittente, crapizante, tremulo, ſubduro, inæquali, inordinato, debili, quandoque & dyſpnœa ad quemlibet motum notabili; habeo ægram,

gram, cujus pulſus ſub actuali palpitatione remittit, vel intermittit, in 5 annum jam hoc ex morbo languentem; ſubin tremorem in præcordiis patitur, cum pulſu caprizante, tremulo; notum eſt, quod regularis pulſatio cordis non dicatur palpitatio.

G. XVII. CLAUDICATIO. 238

Eſt vitioſus gradiendi modus, quo truncus ſingulis paſſibus huc vel illuc nimium inclinat, unde crus indecore movetur, trahitur.

O. IV. SPASMI CLONICI GENERALES.

G. XVIII. PHRICASMUS. 239

Eſt ſuccuſſio invita totius cutis, imo ſæpius totius corporis, frigorifera.

G. XIX. ECLAMPSIA. 240

Eſt morbus convulſivus clonicus acutus, quandoque remittens, cum ſenſuum feriatione in paroxyſmo; pollices intro non premunt, spuma ex ore non eructat, ſpaſmi ſunt tremuli artuum omnium; vulgo vocatur hic morbus *apoplexia puerilis*.

G. XX. EPILEPSIA. 241

Eſt morbus ſpaſmodicus, clonicus, intermittens, ſeu periodicus, chronicus, cum variorum membrorum invita agitatione, dyſpnœa, ſpumæ oris eruptione, pugnorum conſtrictione, ſenſuum & feriatione externorum & internorum, ſine aſphyxia. *Symptomata*: Subitaneus caſus, oblivio omnium, clamor, mugitus, ſtridor dentium, truculentia oculorum, ſpuma oris, pugnorum conſtrictio, totius corporis agitatio.

G. XXI. HYSTERIA. 242

Eſt artuum, organorumque externorum internorumque ſpaſmus clonicus tonicuſve, paroxyſmis fugacibus, leviter variantibus, cum puſillanimitate, ſenſibilitate animæ ſumma, mortis formi-

 dine,

dine, intenſa, teneritudine partium convulſarum remanente, attactum fugiente, & urina hyalina. Signa pathognomica hujus morbi ſtatuit Ill. Aſtruc agitationem matricis, pnycem, conſtrictionem pectoris & glomum fluctuantem in abdomine.

243 G. XXII. SCELOTYRBE.

Eſt motus ſemivoluntarius unius lateris, vel totius corporis in greſſu, ſitu erecto, aut comeſtione, geſticulationem, aut ridiculam hiſtrionis feſtinationem, referens; hunc morbum vocavit *Sydenhamus Choream Sancti Viti*.

244 G. XXIII. BERIBERIA.

Eſt motus gradientium genua ſpaſtice retrahens, cum tremore artuum, formicationis ſenſu, vocis raucedine, ſtupore dolorifico artuum, qui morbis Indis eſt familiaris. In ovibus olim lupum videntibus beriberiam ſpaſmum vidi, ſtantes hæ vel gradientes triſtes momentanee retrahunt genua, ad ſitum naturalem illico reditura.

CLAS-

CLASSIS VIII.

ANHELATIONES.

CHAR. CLASSIS. Eſt agitatio invita, defatigans muſculorum pectoris, cum reſpiratione difficili, laborioſa, ſonora, frequenti, ſine febre notabili, & ſine phlegmaſia.

O. I. ANHELATIONES SPASMODICÆ.

Sunt ſymptomata fugacia ſpaſmodica, ſæpius repetentia, quæ conſiſtunt in vel ex inſpirationibus ſonoris.

G. I. EPHIALTES. 245

Morbus hic recurrens afficit dormientes cum anhelatione & inſomnio corporis cujuſdam pectus opprimentis; unde reſpiratio horum queruſa, gemebunda, & anxia.

G. II. STERNUTATIO. 246

Eſt violenta, ſonora, & ſubitanea expiratio, in nares poſticas immiſſo aere, ad nares everrendas ſub convulſiva capitis & trunci corporis concuſſione, ad anteriora flexione. Species ſunt ſternutationis, *catarrhalis*, *rubeoloſa*, *verminoſa*, *ſpontanea*, *febricoſa*, *epidemica*, *critica*; *medicamentoſa*, &c.

G. III. OSCEDO. 247

Eſt aeris copioſi profunde inſpirati diutina, lenta, & invita naturalis expiratio, cum magno oris hiatu; ſæpe concurrit & pandiculatio.

G. IV. SINGULTUS. 248

Eſt concuſſio diaphragmatis invita, cum inſpiratione ſubito interrupta, ſonora.

G. V. TUSSIS. 249

Eſt concuſſio ſonora, violenta, invita pectoris, cum

expiratione ad pulmonem quodam obice liberandum.

O. II. ANHELATIONES SUPPRESSIVÆ.

Hæ fiunt cum metu ſuffocationis, ſuntque pleræque conſtantes.

250 G. VI. STERTOR.

Eſt reſpiratio ſonum gravem & tremulum in gutture edens, ſæpius ſibilo ſtipata.

251 G. VII. DYSPNŒA.

Eſt difficultas reſpirandi aſſidua & chronica, ſine ſignis empyematis, hydrothoracis.

252 G. VIII. ASTHMA.

Eſt chronica, periodica reſpirandi difficultas.

253 G. IX. ORTHOPNŒA.

Eſt morbus continuus acutus, ſubitanea anhelatione ſublimi, & fere ſuffocatoria, ſtipatus.

252 G. X. PLEURODYNE.

Anhelatio, cum pectoris dolore, ſine phlegmaſia, cum exigua vel nulla febre.

255 G. XI. RHEUMA.

Cognoſcitur ex difficultate reſpirandi, cum ſenſu gravitatis in pectore, quam comitatur coryxa, ſternutatio, raucedo, cephalalgia, tuſſis, ſine pyrexia notabili, & ſine ſanguine inflammato; *endemius hic morbus*.

256 G. XII. HYDROTHORAX.

Eſt genus anhelationis chronicum continuum, ſtipatum phlegmaſia pedum, pallore faciei, oedemate manuum, ſubita in ſomno ſuffecatione, alterutrius manus ſtupore, ſine ſignis empyematis; hæc ſymptomata jam adſunt omnia, jam tantum aliqua; anhelatio creſcit pro inclinatione corporis.

G. XIII.

G. XIII. EMPYEMA. 257

Eſt difficultas reſpirandi a pectoris reclinatione creſcens, quam præceſſit phlegmaſia pectoralis non reſoluta, ſed ſuppurata; comitatur amphimerina tabida notabilis, macies, decubitus horizontalis & in latus ſanum difficilis, gravitas ſupra diaphragma, ſudores profuſi, rubor genarum, & multa ſymptomata hydrothoracis. Species ſunt, *peripneumonicum*, *vomicale*, *pleurale*, *mediaſtinale*, *diaphragmaticum*, *intercoſtale*; quas ſpecies ſufficiat hic nominaſſe; quam earundem hiſtoria necdum ſatis provecta ſit.

CLASSIS IX.

DEBILITATES.

Char. Classis. Eſt impotentia clare & diſtincte ſentiendi, appetendi, conſueta vi artus organave movendi, nec non imaginandi, vigilandi, ſenſibus internis & externis utendi.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare & diſtincte ſentiendi.

G. I. AMBLYOPIA. 258

Eſt viſus debilitas reſpectiva ad ſitum, gradum lucis, diſtantiam objecti, oculis pellucidis; vel eſt debilitas viſus abſoluta, vel reſpectiva, ſine opacitate corneæ, aut vitio internarum partium oculi.

G. II. CALIGO. 259

Eſt imminutio partialis, vel totalis, deletio viſus propter repagulum opacum citra ſeu ante pupillam oculo inhærens, aut palpebris.

260 G. III. CATARACTA.

Eſt viſus debilitas, vel abolitio, ob maculam opacam poſt pupillam poſitam, ſeu opacitatem lentis cryſtallinæ.

261 G. IV. AMAUROSIS.

Eſt viſus ſuppreſſio, abolitio, vel defectus, cum pupillæ ferme plenaria immobilitate, ſine ſenſibili oculorum vitio aut opacitate externis.

262 G. V. ANOSMIA.

Eſt imminuta, vel ſuppreſſa facultas percipiendi odores.

263 G. VI. AGHEUSTIA.

Eſt ſuppreſſio facultatis, qua diverſos ſapores percipimus, cum vel ſine anorexia.

264 G. VII. DYSECŒA.

Eſt audiendi difficultas, ſeu gravis auditus & obſcura perceptio ſonorum.

265 G. VIII. PARACUSIS.

Eſt debilitas ſeu confuſio auditus, qua affecti clare percipiunt voces, ſed non diſtincte diverſos ſonos & articulatas voces audiunt, vel alios ſonos clare & diſtincte audiunt, alios tantum clare ſine diſtinctione.

266 G. IX. COPHOSIS.

Eſt obſcura, vel nulla ſonorum perceptio, ſeu impotentia percipiendi ſonos totalis, vel partialis.

267 G. X. ANÆSTHESIA.

Eſt ſenſus omnis privatio, ſuperſtitibus motu muſculari & rerum neceſſariarum appetitu aliquantum minutis, ſine omni ſopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum ſenſitivorum debilitas, ſeu imminutio notabilis.

G. XI.

G. XI. ANOREXIA. 268

Eſt notabilis debilitas, imminutio, ſeu ceſſatio famis in jejunis animantibus.

G. XII. ADIPSIA. 269

Eſt ſitis debilitas, ſeu imminutio, aut abolitio.

G. XIII. ANAPHRODISIA. 270

Eſt debilitas, vel abolitio appetitus venerei, ſeu impotentia. Vide *ſterilitatem*.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia exercendi motus ſolitos voluntati ſubjectos.

G. XIV. MUTITAS. 271

Eſt impotentia proferendi voces articulatas.

G. XV. APHONIA. 272

Eſt plenaria vocis ſuppreſſio, citra ſtuporem, ſyncopen, & comata; muti inarticulatam vocem habent, aphoni contra nullam.

G. XVI. PSELLISMUS. 273

Eſt difficultas ſeu impotentia quaſdam ſyllabas literaſve recte pronunciandi: faciunt hoc puellæ quædam naviter, ut magis placeant procis.

G. XVII. CACOPHONIA. 274

Eſt vocis vitium & inſuavitas atque aſperitas.

G. XVIII. PARALYSIS. 275

Eſt unius tantum artus, vel articuli frigida plerumque laxa immobilitas, abſque dolore, cum vel ſine anæſtheſia; *pareſis* eſt ſenſim invadens debilitas movendi artus, ſeu eſt imperfecta paralyſis, movent enim hi artus, ſed difficulter; colicam pictonum aliaſque rachialgiæ ſpecies comitatur vel ſequitur pareſis, lente accedit paretica debilitas, & non eſt tanta, quanta obſervatur paralyticorum; actu obſervo pareſin in bra-

brachiis egregiis chirurgi Chriſtophori Noher, ex colica pictonum laborantis.

276 G. XIX. HEMIPLEGIA.

Cognoſcitur ex ſumma debilitate, vel integra motus muſcularis ſuppreſsione unius lateris corporis, cum laxitate, frigiditate, indolentia artuum & mentis integritate, ſine vel cum anæſtheſia.

277 G. XX. PARALEXIA.

Eſt paralyſis artuum inferiorum, vel omnium artuum, cum enureſi, anaphrodiſia, quandoque & aneſthæſia ac maraſmo.

O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Virium vitalium, pulſus, & reſpirationis debilitas ſeu imminutio; *pulſus eſt perpendiculum vitæ*.

278 G. XXI. ASTHENIA.

Eſt debilitas omnium artuum, ſuperſtite actionum vitalium minutarum tenore, ſuperſtitibuſque ſenſibus, ſine dolore.

279 G. XXII. LIPOTHYMIA.

Eſt ſubitanea & brevis virium muſcularium & ſenſuum dejectio, ſeu eclipſatio, ſuperſtite pulſu & cognoſcendi aliqua facultate adſtantes, cum aurium tinnitu, calore, vertiginoſaque capitis turba.

280 G. XXIII. SYNCOPE.

Eſt ſubitanea virium omnium animalium, & vitalium ſenſuumve, imminutio tanta, ut æger per tempus ſui conſcius non ſit, cum lenta lenive reſpiratione, pulſu obſcuro, ſudore frigido, & aliquali interiorum calore.

281 G. XXIV. ASPHYXIA.

Eſt ſubitaneæ eclipſis omnium actionum naturalium, animalium, & vitalium, cum mortis imagine. Vide Cl. *Lanciſium* circa mortes ſubitaneas.

O. V. COMATA, SEU MORBI SOPOROSI.

Omnium ſenſuum feriationes, maximæ debilitates.

G. XXV. CATALEPSIS. 282

Eſt ſenſuum omnium motuumque muſcularium ſuppreſsio, pulſu & reſpiratione pacatis, placidis, lentis, minutis, vel obſcuris, cum mira ad quoſvis ſitus ſuſcipiendos & retinendos artuum flexilitate, aptitudine; retinent figuram, in qua ipſos prehendit morbus, & omnem recipiunt ſervantque, quam illis dederis; morbus eſt recurrens, & fors tantum mulierum.

G. XXVI. ECSTASIS. 283

Eſt ſtatus ſoporoſus a gravi pathemate, vel mentis attentione profunda ortus, ægrum in eodem ſitu, quo prehenſus eſt, retinens, ſine aptitudine cataleptica.

G. XXVII. TYPHOMANIA. 284

Eſt ſopor apparens, cum pervigilio delirioſo reali, muſsitatione, vel eſt ſopor levis e quo ægri facile excitantur, cum delirio comitante.

G. XXVIII. LETHARGUS. 285

Eſt ſtatus ſoporoſus facile excitabilis, cum ſummo imaginationis & memoriæ torpore, oblivione, & febre.

G. XXIX. CATAPHORA. 286

Eſt ſomnolentia facile excitabilis, ſine febre, oblivione, ſtertore, delirio.

G. XXX. CARUS. 287

Eſt ſomnus altiſsimus, vix aut ne vix excitabilis, ſine ſtertore, cum reſpiratione tacita pacatiſsima; morbus ſæpius eſt acutus; ſemi-apertis oculis plerumque dormiunt omnino immobiles.

G. XXXI. APOPLEXIA. 288

Eſt ſomnus profundiſsimus vix aut ne vix excitabilis,

bilis, cum ſtertoroſa reſpiratione, faciei tumore, omnium artuum laxitate, & pulsū pletumque duro, forti.

CLASSIS X.

EXANTHEMATA.

CHAR. CLASSIS: Febris cum aſthenia, efflorescentia cutis maculata varia, puſtuloſa, papuloſa, phlyctenoidea, &c. vel cavi oris, ſæpius maligna.

ORDO I. EXANTHEMATA CONTAGIOSA.

189 G. I. PESTIS.

Eruptio purpuræ, bubonum, anthracum, pemphigi, cum pyrexia typhode, maligna, dat characterem peſtis. Vide celebrem Loimographum *Diemerbrœckium*.

290 G. II. VARIOLA.

Prælūdium variolæ patent cephalalgia, lumbagine, nauſea, vomituritione, eclampſia, & febre continua inflammatoria; erumpunt dein puſtulæ phlegmonoideæ ſuppurantes, eſcharoticæ deciduæ, cicatriſantes; variola ſæpiſsime epidemicus morbus habet IV. ſtadia, nempe contagium, eruptionem, ſeu inflammationem puſtularum, ſuppurationem, tandem exſiccationem.

291 G. III. PEMPHIGUS.

Eſt phlegmaſia ſæpius acuta, exanthematica, ſtipata bullis ſeu veſiculis avellanam circiter magnitudine æquantibus, ſero flavo turgidis, per cutim ſparſis. An *Hippocratis* T. I. p. 684. ichores conſtituerint pemphigum? Tomo citato, p. 798.

p. 798. *Hippocrates* ſcripſit: " πυρετοι οἱ δε πεμφιγωδεις". Et *Claudius Galenus*, ſexto epidemiorum T. I. Claſſe 3. p. 311. Baſileæ 1561, inter reliquas interpretationes hujus febris, etiam hanc admiſit, quæ eſt character hujus generis; nihil ergo novi pemphigus.

G. IV. PURPURA. 292

Sunt maculæ pulicum morſibus ſimiles, faciei parcentes, preſſione non evaneſcentes, carentes ſtigmate aculei a pulice infixi, coloris purpurei, lateritii, nigri, lividi, ſine tumore, aſpredine, cum febre amphimerina, vel tritæophya, putrida, aſthenia, lingua plerumque rubra, lateritia, molli.

G. V. RUBEOLA. 293

Poſt præludium catarrhoſum, coryzam, epiphoram, tuſſim, cephalalgiam, ſomnolentiam, & palpebrarum tumorem, erumpunt papulæ corymboſæ rubræ, pulicum morſus æmulantes, aſperæ, uniformes, evaneſcenti-furfuraceæ die IV. cum exiguo levamine ſymptomatum contagii, in facie, collo, thorace, trunco reliquo, & artubus; quandoque ſexto die in facie jam aſperantur, ſiccantur, & in tenuiſſimum furfurem fatiſcit epidermis; & hoc eſt initium tertii ſtadii, quod ordinario 8. vel 9. die, una cum morbo, finitur; febris comitatur rubeolam continua; rubeolam porro inoculat atmoſphæra morbilloſa bronchiis, ſacco lacrymali, & ſinubus ſex in nares patentibus; medici contra ſeminatores rubeolæ goſſypium furfure morbilloſo repletum ſublimi vulnuſculo, cujuſque brachii imponunt, emplaſtro omnia tegunt, & 6. die poſt appoſitum hunc apparatum incipiunt ægrotare.

G. VI. SCARLATINA. 294

Eſt efflorescentia maculoſa ruberrima, pruriens, papuloſa, irregularis, diffuſa, deſquamabilis, ſine præludio catarrhali efflorescens, cum febre plerumque judicatoria. Stadia tria ſcarlatinæ obſervamus, præludium noſcimus inde quod febris ple-

plerumque judicatoria, cum horrore & frigore, prehendat infantes ſub finem æſtatis; ſine præludio catarrhali & ſine vomitu; quarto vel citius die, facies intumeſcit modice, pectus, &c. erumpunt exanthemata paulo ante deſcripta, & hoc eſt ſtadium ſecundum; poſt 3 vel 4 dies incipit ſtadium tertium, quo evaneſcunt exanthemata, & epidermis ſub forma ſubtilis pollinis deſquamatur.

O. II. EXANTHEMATA NON CONTAGIOSA.

295 G. VII. MILIARIS.

Eruptio phlycthænarum milii ſemine raro majorum, cum ſudore vapido; febris continua, vel remittens, putrida; præludit oppreſſio præcordiorum gaſtrodynia gravans, pulſus ſuppreſſus, urina minus tincta, lingua plerumque alba, mollis, aſthenia; perſtant in cute 4, 5, 6, 7, 9, 11, &c. diebus, & cum pruritu, ſudore ſolvuntur, in farinam ſubtilem diſparent. *Hippocrates*, T. I. p. 697. deſcribit miliarem & quidem criticam, ſeu ſervantem mulieres omnes, quarum cutim obſederat hæc efflorescentia. *Silenus* inſuper indubie 8. die morbi miliari rubra maculatus fuit, T. I. p. 674.

296 G. VIII. ERYSIPELAS.

Eſt eruptio erythematis cum febre continua, vel amphimerina potius dicenda, tumiduli, ſuperficialis, dilatabilis, deſquamabilis; ſiſtit nimirum maculas latas, amplas, ſubtumidulas, non ſuppurabiles; ſanguis miſſus cruſta inflammatoria non eſt tectus, ſed pelle alba, tenui, & ſat tenaci; dolor erythematis eſt calens, rodens. Tria ſtadia obſervantur eryſipelatis: *Primum* abſolvit gravedo, horror, innappetentia, laſſitudo, cum febricula amphimerina; die 2. 3. vel 4. incipit ſecundum ſtadium, eruptio nempe erythematis, quod ordinario in 4. uſque diem augetur;

tur; in tertio ſtadio collabitur ſucceſſive tumor, calor, & dolor erythematis, & epidermis deſquamatur, quod opus plerumque 4. diebus Natura abſolvit.

G. IX. ESSERA. 297

Conſtituunt hoc genus maculæ rubellæ imprurigiñoſæ, non faſtigiatæ ultra libellam cutis, magnitudinis grani tritici, zeæ, ſubito erumpentes ferme ſine febre, & poſt 4, 5, 7, 9, 11, 14, dies ſponte & ſine deſquamatione epidermidis diſparentes, quandoque ſunt paucæ, ſubin contra numeroſæ; ægri ſunt plerumque orthoſtadii; præcedit eruptionem nox inquieta, leves anxietates; cutis, exſtante eſſera, non eſt aſpera ad tactum, nec rubedo eſt diffuſa; maculæ aliæ ſunt majores, aliæ minores, ſub epidermide latentes; hujus morbi meminit *D. Allen*, p. 407. ubi tamen non hunc, ſed alium deſcripſit; Cl. *D. Lieutaud*, T. I. p. 614. unam ſpeciem deſcripſit hujus generis.

298 G. X. APHTHA.

Cognoſcitur aphtha papulis ſeu phlycthænis linguæ, faucium, oris ſuperficiem occupantibus; ſubrotundis, plerumque ſemilineaξibus, colore albis in diſco, cum radio ſæpius rubro, vel rubris, bruneis, flavis, lividis, nigris, & febre tritæophya, vel obſcura hectica, aut penitus nulla; adeſt ſimul ſomnolentia, dolor urens oris, & difficultas in maſticatione, ſuctione, ac deglutitione. Aphtha 4 ſtadia habet diſtincte, ſi non omnibus ſpeciebus, in febrili obſervabilia: Stadium *primum* ſeſe prodit laſſitudine ſpontanea, levi dyſpnœa, gaſtrodynia, anxietate exigua, ſomnis turbatis, & calore oris. Stadium *ſecundum* propullulatio papularum nobis adeſſe loquitur. In ſtadio *tertio* elevantur papulæ ſeu maculæ in phlycthænas miliares, *quæ probabiliter ſunt idem cum miliaribus cutis*. Stadium *quartum* abſolvit deſquamatio epidelii, cum dolore ſenſibiliſſimo linguæ & faucium ſuperficiali.

CLAS-

CLASSIS XI.

PHLEGMASIÆ.

CHAR. CLASSIS. Febris quaſi ſemper continua, cum pulſu duro, dolore topico, alicujus partis inflammatione, ſanguine cruſta inflammatoria tecto, urina plus colorata, lingua ſubſicca, ſicca, calente, &c. *Hippocrates*, T. I. p. 810. 811. reliquit: Lingua concolor attingentibus ipſam humoribus: Quapropter per hanc humores cognoſcimus.

O. I. PHLEGMASIÆ MUSCULOSÆ.

299 G. I. PHLEGMONE.

Cognoſcimus phlegmonem ex febre acuta continua inflammatoria, pulſu duro, ſanguine cruſta inflammatoria tecto, & partis externæ inflammatione; pars externa phlegmone affecta calet rubet, dolet, tumet, eſt ſimul tenſa reſplendens ſphæroidea; cutis ipſa & partes ſub ipſa contentæ inflammatæ ſunt; phlegmone in ſuppurationem tendit, neutiquam vero eryſipelas.

300 G. II. CYNANCHE.

Eſt phlegmaſia acuta pharyngis, laryngis, dyſpnœam & dyſphagiam inducens, cum pyrexia acuta, faucium rubore, calore, dolore, tumore, quæ adeſſe docet inſpectio in fauces, depreſſa lingua.

301 G. III. MYOSITIS.

Febris acuta inflammatoria, dolores in diverſis muſculis artuum, eorundemque involucris, diu noctuque diſcruciantes, motum vetantes ferme omnem, ad noctem exacerbantes; ſanguis miſſus eſt tectus cruſta inflammatoria ſubgelatinoſa, vel pelle tenui tenaci; hic morbus vulgo audit rheumatiſmus acutus.

G. IV. CARDITIS. 302

Adeſt dolor conſtans ſub ſterno in regione cordis urens, flammam vitæ extinguens, cum palpitatione, frequentibus animi deliquiis, pulſu jam magno, duro, per momenta, jam parvo, frequente, inæquali, inordinato, intermittente; febre acuta typhode & anxietatibus; cor manu tenentes ægri fugitivis oculis & mille jactationibus agitati, ſibi comburi, illudque mori queruntur, clamant.

O. II. PHLEGMASIÆ MEMBRANACEÆ.

G. V. PHRENITIS. 303

Eſt phlegmaſia acuta, cum pyrexia & delirio perpetuo, a cephalalgia atroci plerumque incipiens; delirium quandoque eſt audax, urina plerumque citrina, cum nebula ſublimi.

G. VI. DIAPHRAGMITIS. 304

Eſt phlegmaſia cum dolore obſcuro ad coſtas ſpurias, oppreſſione pectoris, ſputis ſæpe cruentis, orthopnœa, anxietate; cingulum præcordia ſtringens queruntur ægri, angulos oris ſemivoluntarie ſæpe retrahentes delirant; quandoque lethargo, vel cataphora laborant; pulſus eſt inæqualis, inordinatus, intermittens, durus; hypochondria intro tracta, reſpiratio ſine motu diaphragmatis; facies jam pallet, jam rubet; calor eſt urens ad præcordia internus; ſcripſi ſicut obſervavi in meis ægris: Vide *Hippocratem*, T. II. p. 161. IX.

G. VII. PLEURITIS. 305

Eſt phlegmaſia cum pyrexia acuta, dyſpnœa, dolore pectoris plerumque punctorio, & tuſſi moleſta dolorem augente, ſine gravitate in medio pectore; ſedes morbi in 300 pleuriticis denatis a P. *Servio Romano* in pleura pulmonali inventa eſt; invenit nimirum pleuram pulmonis ſuper-

ficiem inveſtientem, cum ſuperficialibus & extremis vaſis pulmonis, inflammatam.

306 G. VIII. GASTRITIS.

Eſt phlegmaſia ſtipata dolore epigaſtrii, ardore, tenſione, ſiti, nauſea, vomitione, ſingultu, & pyrexia acutiſſima.

307 G. IX. ENTERITIS.

Eſt phlegmaſia acuta, cujus ſymptomata ſunt tenſio tumida & valde dolorifica, tactum non tolerans, partium abdominis inteſtinis reſpondentium, cum pyrexia, meteoriſmo, quandoque & ileo, vel dyſenteria.

308 G. X. EPIPLOITIS.

Bis obſervavi hanc phlegmaſiam, ſemel in viro ruſtico 30 annorum, & ſemel in quadragenaria muliere, cum ſequente charactere: Febris erat mitis amphimerina, virium non adeo magna proſtratio (ruſticus venerat ipſus 4ta die morbi pro conſilio ad me) lingua alba tumidula, ſanguis miſſus coriaceus, obſtipatio non pertinax, dolor obtuſus infra peritonæum ad attactum paululum acutus, tumor omenti, reſpiratio ſuſpirioſa, pulſus durus naturali celeritate & frequentia non multum major, ſitis mediocris, urinæ flavæ, appetitus aliquis, aliquis & ſomnus.

309 G. XI. CYSTITIS.

Eſt phlegmaſia, cujus præcipua ſymptomata ſunt intumeſcentia ovalis in pelvi, cum tenſione, dolore tactum non tolerante, dyſuria, vel iſchuria, & pyrexia amphimerina; adſunt inſuper vigiliæ, ſitis, ſubin delirium, extremorum frigus, teneſmus, vel obſtipatio; pulſum obſervavi tenſum, ſubdurum, naturali frequentia & celeritate non multum majorem; in ſanguine miſſo cruſtam tenuem albam, ſubgelatinoſam, clyſmatum difficilem injectionem: Scribo ſicut obſervavi,

O. III. PHLEGMASIÆ PARENCHYMATOSÆ.

G. XII. CEPHALITIS. 310

Eſt phlegmaſia, in qua mentis ſtupor, ſomnolentia, ſopor cataphoricus, carphologia adſunt, cum pyrexia acuta typhode; pulſus ſucceſſive molleſcit, cum frequentia ſine celeritate; ægri ſunt admodum debiles; lingua plerumque mollis, ſudor quaſi perpetuus; caput ſæpe manibus impetunt, fricant etiam deliri. Ter obſervavi jam hunc morbum, & poſt mortem in cujuſlibet ægri cadavere ſuppurationem cerebri inveni; reſpirabant hi ægroti cum ſonitu ſine ſtertore.

G. XIII. PERIPNEUMONIA. 311

Pyrexia acuta, dyſpnœa gravis, ſenſu oppreſſionis gravativæ ſub ſterno, calor & anxietas in pectore, tuſſis cruenta, facies rubra, lingua rubra tumidula; pulſus in incremento magnus, ſub inſpiratione remittens, vel penitus intermittens, ad finem morbi mollis.

G. XIV. HEPATITIS. 312

Eſt phlegmaſia acuta, cujus ſymptomata ſunt tenſio dolorifica hypochondrii dextri ſub coſtis ſpuriis, cum ſenſu ardoris ac gravitatis, dyſpnœa, tuſſi ſicca, faciei colore flaveſcente, ſiti, anorexia, ſæpius & ſingultu, vomitione & tumoribus hepatis; pulsus eſt ſubdurus, tenſus; urinæ icteritiæ, glioſæ; ſerum ſanguinis miſſi & cruſta ſubflava; febris quaſi ſemper remittens.

G. XV. SPLENITIS. 313

Cognoſcitur hæc phlegmaſia febre remittente, ſæpius tetartophya, tumore, duritie in regione lienis, dolore tactum fugiente pulſatili, calore, dyſpnœa, pulſu in inſpiratione intermittente in carpo ſiniſtro magis, & abſentia ſymptomatum nephriticorum; frigent hi ægri artubus; calor

internus non eſt adeo magnus, ſanguis miſſus eſt cruſta inflammatoria tectus, cibi adeſt faſtidium, decubitus in latus ſiniſtrum difficilis, ſitis & anxietas. Semel obſervavi hunc morbum ſicut illum hic deſcripſi.

314 G. XVI. NEPHRITIS.

Eſt phlegmaſia pyrexia acuta, dolore renum inflammatorio, urinæ ardore, mictione frequenti ſtipata; dolor ſequitur ureteres, teſtis retrahitur, rotatur, crus ſtupet, plerumque adeſt vomitio, ſine augmento doloris æger poteſt corpus ad anteriora flexum erigere.

315 G. XVII. ETRITIS.

Hanc phlegmaſiam adeſſe noſcimus tumore, ardore, dolore, gravitate in regione uteri, & pyrexia acuta; digiti in vaginam immiſſi os uteri tactum non fert, idem valde calet; adeſt dolor ad inguina, femora, diaphragma, qui ad claviculas extenditur, cum dyſpnœa, nauſea, vomitione, ſingultu, obſtipatione, iſchuria, vel dyſuria horrore perpetuo, frigore extremorum, delirio, jactatione, ſpaſmis, dolore oculorum; pulſus varius, animi deliquia, ſopor, tetanus, catalepſis, obſervantur, cum febre plerumque remittente.

CLAS-

CLASSIS XII.

FEBRES.

Char. Classis. Pulſus frequens, celer, fortis; reſpiratio celeritate, magnitudine, frequentia aucta, viribus artuum minutis; vel virium vitalium augmentum, aut ſaltem in ſtatu ſanitatis perſeveratio, viribus artuum notabiliter minutis.

O. I. FEBRES CONTINUÆ.

Pyrexia ſemel creſcit, & ſemel decreſcit in decurſus ægritudinis.

G. I. JUDICATORIA. 316

Ingruit tota febris ſubito cum frigore, calore, capitis dolore, &c. pulſu aliquo critico, aut evacuationibus criticis, vires artuum parum ſunt minutæ, vires contra vitales multum auctæ, criticæ: abſolvitur 4 diebus.

G. II. HUMORARIA. 317

Cognoſcitur hæc febris pulſu irritationis, incremento ſucceſſivo uſque IV. V. VII. vel IX. diem, duratione morbi uſque VII. IX. XI. vel XIV. diem, notabili debilitate artuum, vehementibus ſymptomatibus, & humorum augmento, aut vitio, unde noſcitur.

G. III. FRIGERARIA. 318

Eſt febris continuæ genus, quæ decurrit ad XVII. XXI. vel XXX. diem, incrementum habet longius præcedente; ingruit cum pulſu irritationis; pulſu & reſpiratione auctis, viribus artuum multum minutis, notabili frigore ſæpe & rigore, unde *Frigeraria*; lingua eſt ſordida, excreta omnia fœtida, a ſtatu naturali multum diſtantia; hæc eſt febris proprie *putrida*.

319 G. IV. TYPHUS:

Eſt febris continuæ genus, quæ plerumque ultra tres ſeptimanas durat, calore jam magno, jam nullo, urina & pulſu ſanorum ſimilibus, artuum ſumma debilitate; pulſus quandoque rarior eſt quam pulſus ſanus, color cutis pallidus, ſqualidus, exanthemata varia huic morbo ſupervenìunt epigenomena.

320 G. V. HECTICA.

Eſt febris continua, quæ chronicorum morborum more ſenſim extendi ſuevit per plures ſeptimanas, imo menſes, ſine notabili virium proſtratione, cum exigua pulſus frequentia; urina ſæpius eſt turbida, pelliculam innatantem pinguem gerit; pulſus eſt ſubdurus, poſt paſtum frequentior, calor ad attactum eſt mordens; ſudores nocturni; febris hæc, nullam habens exacerbationem notabilem, differt ab omni amphimerina, phthiſi, & tabe, quia ſuppurationem pro cauſa non habet; ægri ſunt plerumque orthoſtadii.

O. II. FEBRES REMITTENTES.

Sunt febres continuæ cum exacerbationibus quotidianis, tertianis, quartanis, &c.

321 G. VI. AMPHIMERINA.

Eſt febris continua, cum exacerbationibus quotidianis ſibi ſimilibus.

322 G. VII. TRITÆOPHYA.

Eſt febris continua, cum exacerbationibus tertianis.

323 G. VIII. TETARTOPHYA.

Eſt febris continua, cum exacerbationibus quartanis, ſeu quartanæ typum ſervantibus.

O. III. FEBRES INTERMITTENTES.

Pyrexia in decurſu ægritudinis pluries penitus deſerit ægrum, & redit cum intervallis mediis lucidis ſervata periodo.

G. IX. QUOTIDIANA. 324

Febris intermittens, cujus paroxyſmi ſimiles redeunt nycthemeris ſingulis.

G. X. TERTIANA. 325

Eſt febris intermittens, cujus paroxyſmi alternis diebus ſibi ſimiles repetunt, ſeu circuitum ſervant; urinæ lateritiæ ſunt optimum ſignum febrium intermittentium.

G. XI. QUARTANA. 326

Eſt febris intermittens, cujus paroxyſmi ſibi ſimiles quarta quavis die abeunt, & revertuntur, inter quoslibet duos paroxyſmos intercedunt duæ dies apyretæ.

G. XII. ERRATICA. 327

Hæc febris diſtinguitur ab aliis generibus per acceſſus ſimiles pluribus diebus ab invicem diſtantes quam duobus, nec proinde ad priora genera referri poteſt.

CLASSIS XIII.

VESANIÆ.

Char. Classis. Morbus mentis, ſeu error in imaginatione, appetitu, judicio, vel memoria.

ORDO I. HALLUCINATIONES.

Imaginationes deceptivæ ex errore organi, vel mentis natæ.

328 G. I. VERTIGO.

Eſt hallucinatio, qua objecta, licet quieſcentia, e loco moveri, nutare, vel in gyrum verſari, nobis videntur, ipſeque æger quandoque ſibi nutare videtur; dicta phænomena etiam clauſis oculis plerique patiuntur.

329 G. II. SUFFUSIO.

Eſt genus morbi imaginarii, cujus præcipuum ſymptoma eſt hallucinatio viſus circa objecta videntis corpora, quorum prototypus extra oculos non exiſtit; ſuffuſio repræſentat corpora quæ non ſunt, & vertigo motum corporum, quo actu non aguntur.

330 G. III. DIPLOPIA.

Eſt hallucinatio, qua affecti idem objectum geminatum, aut multiplicatum, videntur ſibi videre.

331 G. IV. SYRIGMUS.

Eſt error imaginationis ſonos, qui extra aurem non ſunt, ſibi repræſentantis, a commotione vibratoria organorum acuſticorum per principia in aure latentia natos.

332 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Eſt delirium circa propriam valetudinem, natum ex philautia, ſalvo ratiocinio de reliquis, delirant & deſperant de ſua valetudine recuperanda ob ructus, borborygmos, palpitationes, tremorem præcordiorum, fugaces vertigines, flatulentiam, &c. Hinc hi perſuaſi fatum lethale ſibi imminere, omnia ſymptomata & minimas mutationes in corpore ſuo ſcrupoloſe obſervant, narrant, & deſcribunt medicis, ſuiſque querelis alios mox & alios defatigant, ingenio cæterum & appetitu pollentes.

333 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Eſt dormientium hallucinatio, ſomniantes, nempe ob imaginationem vividiſſimam, ſopitis ſomno ſenſibus, motus muſculares exercent, ſurgunt e le-

electo, variis periculis ſeſe exponunt, tecta ſcandunt, iter ſuſcipiunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates, vel averſationes depravatæ.

G. VII. PICA. 334

Eſt alimentorum inaſsuetorum, vel rerum indigeſtibilium, appetitus, cum aſsuetorum averſatione.

G. VIII. BULIMIA. 335

Eſt appetitus majoris alimentorum digeſtibilium & ſolitorum copiæ, quam quæ a viribus ventriculi digeri poteſt.

G. IX. POLYDIPSIA. 336

Eſt potulentorum appetitus immodicus.

G. X. ANTIPATHIA. 337

Eſt averſatio quorundam objectorum tanta, quod homo ex eorum viſu, odoratu, auditu, &c. gravia ſymptomata patiatur.

G. XI. NOSTALGIA. 338

Eſt deſiderium videndi parentes, cognatos, ſolumque natale adeundi adeo ardens, ut hac ſola anhelatione occupati penitus langueant, horumque animæ commercium cum corpore ferme ſublatum ſit; unde languent omnes ſenſus, & appetitus alii; hectica febris hos miſeros conſumit, & ad lethum ducit, ſi adeundi patriam cognatos copia denegetur; olim in Croatia Criſii laboravi hoc malo cum apoſitia, & obſtipatione, intumueram ex anaſarca pervigil & debilis; redux ad patriam ſine omni pharmaco convalui; deſiderans varia ardentiſſime.

G. XII. PANOPHOBIA. 339

Eſt ſummus pavor inter dormiendum ſine cauſa evidenti ortus; clamant hi, gemunt, tremunt, ſudant; hoc genus non multum differt ab ephiaite.

340 G. XIII. SATYRIASIS.

Eſt morbus proprius viris, cujus præcipuum ſymptomata eſt effrænis impudenſque veneris cupiditas, cum libidinoſa penis tentigine; priapiſmus caret cupiditate libidinoſa.

341 G. XIV. NYMPHOMANIA.

Hujus generis character eſt effræne, audax, & impudens in fœminis veneris deſiderium.

342 G. XV. TARANTISMUS.

Hic morbus ſcribitur in Apulia eſſe endemius, cujus præcipuum ſymptoma eſt inexplicabilis ſaltandi, choreas agendi cupiditas; a tarantulæ morſu excitari hunc morbum judicat Baglivias, quod Ill. Serao & experimenta Romana inficiantur.

343 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Eſt morbus, cujus præcipuum ſymptoma eſt incredibilis potulentorum omnium averſatio, impoſſibilis deglutitio; vitant inſuper lucem & aeris motum.

334 G. XVII. RABIES.

Eſt morbus in lupis & canibus obſervatus, cujus præcipuum ſymptoma eſt effrænis cupiditas mordendi obvios omnes, licet innocuos, ſine hydrophobia; conſtat enim repetita apud Gallo-Provinciales experientia canes lupoſque rabidos bibiſſe, manducaſſe, & flumen tranaſſe; hic nihilominus morbus ſæpius eſt ſymptoma hydrophobiæ: Vide diſſertationem Ill. de *Sauvages* de Rabie. Rabies porro datur *canina*, *maniaca*, & *dæmonomaniaca*. Vide *Hydrophobiam*.

O. III. DELIRIA.

Delirium eſt ortus idearum non reſpondens objectis

ctis in ſenſus incidentibus, ſed internæ cerebri diſpoſitioni a qua naſcuntur ideæ delirantium.

G. XVIII. PARAPHROSYNE. 345

Eſt delirium fugax a veneno, vel alio morbo dependens, cujus comes & ſymptoma eſt.

G. XIX. AMENTIA. 346

Eſt inſania chronica, univerſalis, mitis, ſeu ineptitudo ad recte ratiocinandum & judicandum, cum ſenſu & perceptione objectorum, aſt ſine attentione.

G. XX. MELANCHOLIA. 347

Eſt inſania chronica partialis, mœſta, meditabunda; delirant melancholici ſine furore, & ſine febre, de uno potiſſimum objecto conſtanter, delirant circa ſemetipſos, aut ſuum ſtatum, de reliquis objectis adhuc ſat bene ratiocinantes; mihi videtur cauſa hujus morbi latere in abdomine, ganglia ſemilunaria afficere, & plexus nervorum abdominales.

G. XXI. DÆMONOMANIA. 348

Eſt delirium ſine febre reipſa tale, vel tantum ſimulatum, quo magi, ſagæ, præſtigiatores ſe tanquam a dæmone obſeſſos oſtentant, varia phænomena leges naturales excedentia præſtare, exhibere volunt.

G. XXII. MANIA. 349

Eſt delirium apyretum circa quævis objecta, cum furore, audacia, ac robore; maniaci habent plerique lucida intervalla; ſubin eſt mania periodica, unde Lunatici; ſanguis maniacorum viſcidus, ſeroque carens, fibræ muſculares rigidæ.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

350 G. XXIII. AMNESIA.

Eſt memoriæ imminutio aut plenaria abolitio.

351 G. XXIV. AGRYPNIA.

Pervigilium immodicum vel continuum, ex quo vires imminuntur; anxietas, inquietudo, anorexia, cephalalgia, aliaque moleſta ſymptomata, oriuntur.

PARS QUINTA.

TABULÆ NOSOLOGICÆ

AB EXIMIO MEDICO

DAVIDE MACBRIDE

COMPOSITÆ.

EX EJUS OPERE

CUI TITULUS,

A Methodical Introduction to the Theorie and Practice og Phyſic.

London 1772.

TABULÆ NOSOLOGICÆ.

Eruditus auctor morbos in quatuor claſſes, in univerſales ſcilicet, locales, ſexuales, & infantiles, diſtribuere voluit: diſtributionem tamen non niſi per primam claſſem proſecutus eſt.

Morbos in hac claſſe comprehendendos in novem tabulas, ſive ordines diſpoſuit, quos hic recenſere volumus.

ORDO I. FEBRES.

GENUS I. FEBRIS CONTINUA.

Species 1. Continua ſimplex.

Varietates ſunt A Continua ſimplex plethorica.
B Continua ſimplex a frigore.
C Continua ſimplex a calore.
D Continua ſimplex a dolore.
E Continua ſimplex catharralis.

Sp. 2. Continua inflammatoria.

Var. A Continua inflammatoria cephalalgica.
B Continua inflammatoria ſoporoſa.
C Continua inflammatoria pleuritica.
D Continua inflammatoria rheumatica.
E Continua inflammatoria dyſenterica.

Sp. 3. Continua nervoſa.

Var. A Continua nervosa communis ſeu febricula.
B Continua hyrocephalica.

Sp. 4.

Sp. 4. Continua putrida.

Var. A Continua putrida carceraria.
B Continua putrida maligna Hungar,
C Continua putrida maligna Ægyptiorum.
D Continua putrida icteriodes Carolinenſis.
E Continua putrida icteriodes Canadenſis.

Sp. 5. Continua miſta.

Var. A Continua miſta depuratoria.
B Continua miſta sudatoria.
C Continua miſta comatoria.
Var. D Continua miſta varioloſa.
E Continua miſta hyemalis.
F Continua miſta verminoſa.

G. II. FEBRIS INTERMITTENS.

Sp. 1. Quotidiana.

Var. A Quotidiana ſimplex.
B Quotidiana duplicata.
C Quotidiana hyſterica.
D Quotidiana cephalalgica.

Sp. 2. Tertiana.

Var. A Tertiana legitima.
B Tertiana ſpuria.
C Tertiana pleuritica.
D Tertiana aſthmatica.
E Tertiana carotica.
F Tertiana cardialgica.
G Tertiana duplex.
H Tertiana duplicata.
I Tertiana urticata.
K Tertiana hemiplegica.
L Tertiana rheumatica.

Sp. 3. Quartana.

Var. A Quartana legitima.
B Quartana ſplenetica.
C Quartana hepatica.
D Quartana metaſtatica.

Sp. 4. Erratica.
Var. Quintana, Sextana, &c.

G. III. FEBRIS REMITTENS.

Sp. 1. Remittens inflammatoria.
Var. A Remittens inflammatoria catarrhalis.
B Remittens inflammatoria peripneumonica.
C Remittens inflammatoria ardens.

Sp. 2. Remittens putrida.
Var. A Remittens putrida bilioſa.
B Remittens putrida anginoſa maligna.
C Remittens putrida paludoſa.

G. IV. FEBRES EXANTHEMATICA.

Sp. 1. Variola.
Var. A Variola ſimplex.
a Variola ſimplex diſcreta.
b Variola ſimplex confluens.
c Variola ſimplex cryſtallina.
d Variola ſimplex verrucoſa.
B Variola complicata.
a Variola complicata inflammatoria.
b Variola complicata cryſtallina.
c Variola complicata nigra ſeu ſanguinea.
d Variola complicata dyſenterica.

Sp. 2. Morbilli.
Var. A Morbilli regulares.
B Morbilli anomali.
C Morbilli varioloſi.

Sp. 3. Scarlatina.
Var. A Scarlatina benigna.
B Scarlatina maligna.

Sp. 4. Eryſipelas.

Sp. 5. Miliaria.
Var. A Miliaria ſimplex.
B Miliaria catarrhalis.
C Miliaria inflammatoria.
D Miliaria ſeroſa.
E Miliaria putrida ſeu petechialis.

Sp. 6. Aphtha.

Sp. 7. Pemphigus.

Sp. 8. Peſtis.

G. V.

G. V. HECTICA.

Sp. 1. Phthiſis.

Var. A Phthiſis ſicca.

B Phthiſis mucoſa.

C Phthiſis hæmoptoica.

D Phthiſis ſcrophuloſa.

E Phthiſis ſcorbutica.

F Phthiſis aſthmatica.

G Phthiſis ſyphilitica.

Var. H Phthiſis arthritica.

I Phthiſis hypochondriaca.

K Phthiſis chlorotica.

Sp. 2. Tabes.

Var. A Tabes hepatica.

B Tabes meſenterica.

C Tabes dorſalis.

D Tabes ſcrophuloſa.

E Tabes ſcorbutica.

F Tabes aſthmatica.

G Tabes ſyphilitica.

H Tabes arthritica.

I Tabes hypochondriaca.

K Tabes chlorotica.

ORDO II. INFLAMMATIONES.

G. I. INFLAMMATIO EXTERNA.

Sp. 1. Phlegmone.

Sp. 2. Eryſipelas.

Sp. 3. Furunculus.

Sp. 4. Anthrax.

Sp. 5. Ophthalmia.

Sp. 6. Cynanche.

Var. A Cynanche tonſillaris.

B Cynanche trachealis.

C Cynanche ſuffocatio ſtridula, Croup.

D Cynanche maxillaris.

G. II. INFLAMMATIO INTERNA.

Sp. 1. Phrenitis.

Sp. 2. Otitis.

Sp. 3. Carditis.

Sp. 4. Pleuritis.

Var. A Pleuritis ſimplex.

B Pleuritis complicata.

Sp. 5.

Sp. 5. Peripneumonia.
Var. A Peripneumonia ſimplex.
B Peripneumonia complicata.
Sp. 6. Paraphrenitis.
Sp. 7. Hepatitis.
Sp. 8. Splenitis.
Sp. 9. Epiploitis.
Sp. 10. Gaſtritis.
Var. A Gaſtritis exanthematica.
B Gaſtritis a veneno.
C Gaſtritis traumatica.
Sp. 11. Enteritis.
Var. A Enteritis dyſenterica.
B Enteritis hernioſa.
C Enteritis a veneno.
Sp. 12. Meſenteritis.
Sp. 13. Nephritis.
Sp. 14. Cyſtitis.

ORDO III. FLUXUS.

G. I. ALVIFLUXUS.

Sp. 1. Cholera.
Var. A Cholera ſpontanea.
B Cholera verminoſa.
C Cholera arthritica.
Sp. 2. Dyſenteria.
Var. A Dyſenteria putrida.
B Dyſenteria inflammatoria.
Sp. 3. Diarrhœa.
Var. A Diarrhœa ſtercoroſa.
B Diarrhœa bilioſa.
C Diarrhœa ſeroſa.
D Diarrhœa verminoſa.
Sp. 4. Lienteria.
Sp. 5. Cœliaca.
Sp. 6. Hepatirrhœa.
Sp. 7. Melana.

G. II. HÆMORRHAGIA.

Sp. 1. Epiſtaxis.
Var. A Epiſtaxis critica.
B Epiſtaxis activa.
C Epiſtaxis paſſiva.
Sp. 2. Hæmoptyſis.
Var. A Hæmoptyſis accidentalis.

B Hær

B Hæmoptyſis habitualis.
C Hæmoptyſis periodica.
D Hæmoptyſis traumatica.
Sp. 3. Hæmatemeſis.
Sp. 4. Hæmaturia.
Sp. 5. Hæmorrhois.
G. III. FLUXUS HUMORALES.
Sp. 1. Ephidroſis.
Sp. 2. Diabetes.
Var. A Diabetes verus.
B Diabetes hyſtericus.
C Diabetes arthriticus.
D Diabetes febricoſus.

O. IV. DOLORES.

Sp. 1. Arthritis regularis.
Sp. 2. Arthritis irregularis.
Sp. 3. Arthritis complicata.
Var. A Arthritis rheumatica.
B Arthritis chlorotica.
C Arthritis melancholica.
D Arthritis ſcorbutica.
E Arthritis ſyphilitica.
F Arthritis aſthmatica.
G Arthritis cardialgica.
Var. H Arthritis exanthematica.
I Arthritis rachiſtica.
G. II. RHEUMATISMUS.
Sp. 1. Rheumatiſmus acutus.
Sp. 2. Rheumatiſmus chronicus.
Var. A Rheumatiſmus deſentericus.
B Rheumatiſmus arthriticus.
C Rheumatiſmus ſcorbuticus.
D Rheumatiſmus ſyphiliticus.
E Rheumatiſmus hyſtericus.
Sp. 3. Lumbago.
Sp. 4. Sciatica.
G. III. OSTOCOPUS.
Sp. 1. Oſtocopus ſpina ventoſa.
Sp. 2. Oſtocopus cancroſus.
Sp. 3. Oſtocopus ſyphiliticus.
Sp. 4. Oſtocopus ab oſteoſarcoſi.
Sp. 5. Oſtocopus ſcorbuticus.

G. IV. DOLOR CAPITIS.
Sp. 1. Cephalalgia.
Sp. 2. Cephalæa.
Sp. 3. Hemicrania.
G. V. ODONTALGIA.
Sp. 1. Odontalgia catarrhalis.
Sp. 2. Odontalgia carioſa.
Sp. 3. Odontalgia ſcorbutica.
Sp. 4. Odontalgia arthritica.
Sp. 5. Odontalgia hyſterica.
G. VI. OTALGIA.
Sp. 1. Otalgia inflammatoria.
Sp. 2. Otalgia purulenta.
Sp. 3. Otalgia verminoſa.
Sp. 4. Otalgia ab intruſis.
Sp. 5. Otalgia catarrhalis.
G. VII. PLEURODYNE.
Sp. 1. Pleurodyne plethorica.
Sp. 2. Pleurodyne flatulenta.
Sp. 3. Pleurodyne a ſpaſmate.
Sp. 4. Pleurodyne parapleuritica.
Sp. 5. Pleurodyne verminoſa.
G. VIII. DOLOR VENTRICULI.
Sp. 1 Pyroſis.
Var. A Pyroſis a ſaburra.
B Pyroſis bilioſa.
C Pyroſis ulceroſa.
Sp. 2. Cardialgia.
Var. A Cardialgia ſaburralis.
Var. B Cardialgia a veneno.
C Cardialgia ſputatoria.
D Cardialgia bradypepta.
E Cardialgia arthritica.
F Cardialgia verminoſa.
Sp. 3. Gaſtrodynia.
Var. A Gaſtrodynia ab ingluvie.
B Gaſtrodynia flatulenta.
C Gaſtrodynia biliosa.
D Gaſtrodynia a veneno.
E Gaſtrodynia a xyphoide.
F Gaſtrodynia ab extraneis.
G. IX. COLICA.
Sp. 1. Colica flatulenta.

Sp. 2. Colica inflammatoria.
Sp. 3. Colica bilioſa.
Sp. 4. Colica iliaca.
Sp. 5. Colica nervoſa.

G. X. LITHIASIS.
Sp. 1. Lithiaſis nephritica.
Sp. 2. Lithiaſis cyſtica.

G. XI. ISCHURIA.
Sp. 1. Iſchuria renalis.
Var. A Iſchuria renalis ab inflammatione
B Iſchuria renalis mucoſa.
C Iſc huria veſicalis, calculosa ſeu arenoſa.
Sp. 2. Iſchuria veſicalis.
Var. A Iſchuria veſicalis calculosa.
B Iſchuria veſicalis inflammatoria.
C Iſchuria veſicalis ſpaſmodica.
D Iſchuria veſicalis paralytica.
E Iſchuria veſicalis polyurica.
F Iſcuria purulenta.
Sp. 3. Iſchuria urethralis.
Var. A Iſchuria urethralis caruncoloſa.
B Iſchuria urethralis urethro-lithica.
C Iſchuria urethralis hydrocelodes.

G. XII. PROCTALGIA.
Sp. 1. Proctalgia inflammatoria.
Sp. 2. Proctalgia fiſtuloſa ſeu purulenta.
Sp. 3. Proctalgia hæmorrhoidalis.
Sp. 4. Proctalgia cancroſa.
Sp. 5. Proctalgia intertryginoſa.

O. V. SPASMI.

G. I. TETANUS.
Sp. 1. Tetanus epiſthotonos.
Sp. 2. Tetanus opiſthotonos.

G. II. CATOCHUS.

G. III. TRISMUS.
Sp. 1. Triſmus ſpontaneus vel primarius.
Sp. 2. Triſmus ſecundarius.

G. IV. HYDROPHOBIA.
Sp. 1. Hydrophobia ſpontanea.
Sp. 2. Hydrophobia ſecundaria.

G. V. CONVULSIO.
Sp. 1. Convulſio ab inanitione.

Sp. 2.

Sp. 2. Convulſio traumatica.
Sp. 3. Convulſio verminoſa.
Sp. 4. Convulſio plethorica.
G. VI. EPILEPSIA.
G. VII. ECLAMPSIA.
G. VIII. HIERANOSUS.

O. XI. ADYNAMIÆ.

G. I. COMA.
Sp. 1. Apoplexia.
Var. A Apoplexia ſanguinea.
B Apoplexia ſeroſa.
C Apoplexia traumatica.
D Apoplexia temulenta.
Sp. 2. Carus. Sp. 3. Lethargus.
Sp. 4. Catalepſis.
G. II. PARALYSIS.
Sp. 1. Hemiplegia.
Sp. 2. Paraplegia.
G. III. DELIQUIUM.
Sp. 1. Leipothymia.
Sp. 2. Syncope.
Sp. 3. Aſphyxia.

O. VII. ANHELATIONES.

G. I. DYSPNŒA.
Sp. 1. Dyſpnœa pituitoſa.

Sp. 2. Dyſpnœa a tuberculis.
Sp. 3. Dyſpnœa calculoſa.
Sp. 4. Dyſpnœa phyſconialis.
Sp. 5. Dyſpnœa ſcorbutica.
G. II. ORTHOPNŒA.
Sp. 1. Orthopnœa idiopathica.
Var. A Catarrhus ſuffocativus.
B Peripneumonia notha.
Sp. 2. Orthopnœa ſympathica.
Var. A Orthopnœa hyſterica.
B Orthopnœa ſtomachica.
G. III. ASTHMA.
Sp. 1. Aſthma humidum.
Sp. 2. Aſthma ſiccum.
G. IV. HYDROTHORAX.
G. V. EMPYEMA.

O. VIII. MENTALES.

Morborum, qui ſub hoc titulo recenſeri poſſint, nullam tabulam hic appoſuit clariſs. Auctor, & ob hanc cauſam, ut videtur, quod dubitat an genera maniæ & melancholiæ, ſub hoc titulo vulgo recenſita, revera aliter differant quam idem natura morbus, qui ſub diverſa facie diverſis temporibus compareat.

O. IX. CACHEXIÆ.

G. I. POLYSARCIA.
G. II. HYDROPS.
Sp. 1. Anaſarca.
Sp. 2. Hydrocephalus.
Sp. 3. Hydrops pectoris.
Sp. 4. Aſcites.
G. III. ICTERUS.
Sp. 1. Icterus ſpaſmodicus.
Sp. 2. Icterus a preſsura.
Sp. 3. Icterus calculoſus.
G. IV. EMPHYSEMA.
Sp. 1. Emphyſema primarium.
Sp. 2. Emphyſema ſecundarium a vulneribus thoracis.
G. V. TYMPANIATES.
G. VI. PHYSCONIA.
G. VII. ATROPHIA.
G. VIII. OSTEOSARCOSIS.
G. IX. SARCOSTOSIS.
G. X. MORTIFICATIO.
Sp. 1. Sphacelus.
Sp. 2. Necroſis.
G. XI. SCORBUTUS.
G. XII. SCROPHULA.
G. XIII. CANCER.
G. XIV. LUES VENEREA.

FINIS TOMI PRIMI.